



Ray-grass italien non alternatif 4n

# ANCAR

Du stock et de la pâture



- Démarrage précoce au printemps
- Peu remontant, facile à pâturer
- Fort potentiel de production

Semences de France 

[www.semencesdefrance.com](http://www.semencesdefrance.com)



Ray-grass italien non alternatif 4n

**ANCAR**

Du stock et de la pâture



Ensilage



Enrubannage



Déprimage  
- Pâturage



Foin  
- Regain

## Identification

Ploïdie :	tétraploïde
Type :	non alternatif
Pérennité :	24 mois
Epiaison :	10 mai

## Préparation du sol

S'assurer que la parcelle est propre avant de semer : si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non d'un désherbage.

Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface, pour permettre un bon contact sol/graine.

## Semis

Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité voulue. En cas d'association d'espèces, penser à bien mélanger les semences.

Déposer les semences à 1 cm de profondeur au maximum. Rouler pour refermer le semis.

## Protection de la culture

Surveiller la population de limaces et traiter si nécessaire.

Ne pas hésiter à désherber la jeune prairie afin de préserver sa population, son rendement, sa qualité et sa pérennité.

## Fertilisation

Raisonnement en fonction des analyses de sols et de la CEC pour déterminer la fréquence des apports, les dates et les quantités.

Tenir compte de la réglementation en vigueur. En cas d'association avec une légumineuse, ne pas oublier d'adapter les apports de N, P et K de façon à maintenir l'équilibre des populations.

## Entretien

Différentes opérations d'entretien mécanique peuvent être pratiquées :

- Fauche des refus ;
- Ebousage ;
- Hersage.


Date de création: 09/2015.



SEMENCES DE FRANCE

62, rue Léon Beauchamp - BP 18  
59932 La Chapelle d'Armentières Cedex  
Tel : +33 (0)3 20 48 41 41 - Fax : +33 (0)3 20 48 41 30  
Email: contact@semences-de-france.fr

## Caractères agronomiques



Source: CTPS

## Rendement en matière sèche (en tonnes / ha)

	ANCAR	Témoin
Pluriannuel		
1 <sup>ère</sup> coupe (A2+A3)	14,71	14,7
Printemps (A2+A3)	24,62	24,2
Eté - Automne (A2+A3)	5,37	5,4

Source: CTPS. Témoin = T1 = [Tonyl + Caballo/2]

## Associations et doses possibles

ANCAR 20 kg + trèfle violet 8 à 10 kg

- Excellente souplesse d'exploitation pour plus de mixité dans son utilisation.
- Faible remontaison qui assure à la variété une pousse feuillue et appétente.
- Très bonne résistance aux maladies, favorisant une bonne qualité alimentaire et une bonne ingestion par les animaux.
- Semer à la dose de 30 kg/ha en pur.
- Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéristiques climatiques de votre région :
  - Du 15 mars à fin avril ;
  - Du 15 août au 15 novembre.