



RAY-GRASS ITALIEN 4N



CANNIBALE

LE PREMIER RGI

ANTI-NÉMATODES



Rendement et production rapide en semis d'été

Résistance aux nématodes des céréales et du Maïs

Fourrage appétent, de bonne valeur alimentaire



RAY-GRASS ITALIEN 4N CANNIBALE

RENDEMENT ET
PRODUCTION
RAPIDE EN SEMIS
D'ÉTÉ

RÉSISTANCE AUX
NÉMATODES DES
CÉRÉALES ET DU
MAÏS

FOURRAGE
APPÉTENT, DE BONNE
VALEUR
ALIMENTAIRE

IDENTIFICATION

PLOÏDIE	tétraploïde
TYPE	alternatif
PÉRENNITÉ	12 à 18 mois
ÉPIAISON	18 juin

Développement végétatif très rapide caractéristique d'un alternatif.

CANNIBALE ne fait pas que produire du fourrage en quantité, il lutte efficacement sur les problématiques nématodes sur Céréales et Maïs (*Heterodera avenae).
Source : inscription CTPS CANNIBALE

Il offre plus de souplesse dans son exploitation de par sa tardiveté d'épiaison.

CARACTÈRES AGRONOMIQUES

Alternativité
De 1 à 9 = très alternatif



Résistance aux rouilles sp
De 1 à 9 = résistant



Source : CTPS

RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE

		CANNIBALE	TÉMOIN
Semis de printemps	1ère coupe	3,8	3,6
	Rendement total	8,7	8,3
Semis d'automne	1ère coupe	7	7,1
	Rendement total	15,1	15

Source : CTPS. Témoin = Barspectra

DOSES DE SEMIS

30 kg/ha en pur

PÉRIODES DE SEMIS

- > Du 15 mars à fin Avril ;
- > Du 15 août au 15 Novembre.

ASSOCIATIONS POSSIBLES



RECOMMANDATIONS CULTURALES

Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface

Profondeur de semis optimale : 1 cm - Rouler après semis

Surveiller la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire

Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses de sols

Entretiens mécaniques possibles : Fauchage / Ébousage / Hersage