







UNE PRODUCTION RÉGULIÈRE SUR Toute l'année PROFILÉ POUR UNE Consommation Optimum

IDENTIFICATION


| PLOÏDIE | tétraploïde |
|-----------|-------------|
| TARDIVETÉ | très tardif |
| PÉRENNITÉ | 5 ans |
| ÉPIAISON | 7 juin |
| SOUPLESSE | 65 jours |

CARVALLO a une très bonne résistance aux maladies. Cela renforce son potentiel de production, pérennité et surtout cela maintient son haut niveau d'appétence et de performance aussi bien au niveau de la production laitière que viande.

CARVALLO a une très bonne couverture de terrain pour une prairie très dense, il résiste très bien au piétinement et limite le développement des mauvaises herbes.

CARVALLO produit très peu de tiges, donc la qualité des fourrages et l'appétence restent élevées, même en été.

CARACTÈRES AGRONOMIQUES



Sources CTPS

RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE

| | | CARVALLO | TÉMOIN |
|-------------|--------------------------------|----------|--------|
| Pluriannuel | 1 ^{ère} coupe (A2+A3) | 2,9 | 2,7 |
| | Printemps (A2+A3) | 12 | 11,7 |
| | Été-Automne (A2+A3) | 5,4 | 4,9 |

Source: CTPS. Témoin = (Carosse + Escal + Alcazar)/3)

DOSES DE SEMIS

30 kg/ha en pur

PÉRIODES DE SEMIS

- > Du 15 mars à fin avril
- > Du 15 août au 15 novembre

ASSOCIATIONS POSSIBLES



CARVALLO CIOKGI





CARVALLO (10KG)



● RGA 2N (5KG) ● F. DES PRÈS (10KG) ● T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

RECOMMANDATIONS CULTURALES

Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface Profondeur de semis optimale : 1 cm - Rouler après semis Surveiller la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire

Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses

de sols

