











IDENTIFICATION

PLOÏDIE	diploïde
ТҮРЕ	italien
PRÉCOCITÉ	intermédiaire
PÉRENNITÉ	3 ans
ÉPIAISON	8 mai


GUPINA a une pousse régulière et bien répartie tout le long de l'année pour plus de souplesse dans son exploitation fauche / pâture.

Sa très forte tolérance aux maladies assure un fourrage de qualité et d'appétence sur toutes les exploitations et aussi une très bonne pérennité.

De par sa ploïdie et son feuillage très fin, le chantier de récolte en fourrage sec est plus facile : un séchage rapide, réduction de poussières, limitation de pertes et de contaminations par le sol ou conservation.

Sa morphologie et son rythme de pousse facilitent le développement de la légumineuse en cas d'association.





DOSES DE SEMIS

25 kg/ha en pur

PÉRIODES DE SEMIS

- > Du 15 mars à fin avril
- > Du 15 août au 15 novembre

RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE

		GUPINA	TÉMOIN
Pluriannuel	1 ^{ère} coupe (A2+A3)	13,5	13,1
	Printemps (A2+A3)	21	20,1
	Été-automne (A2+A3)	5,5	5,5

Sources CTPS Témoin (Cador + Dorial)/2

RECOMMANDATIONS CULTURALES

Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface Profondeur de semis optimale : 1 cm - Rouler après semis Surveiller la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire

Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses

de sols

ASSOCIATIONS POSSIBLES



