



IDENTIFICATION

PLOÏDIE	tétraploïde	
ТҮРЕ	intermédiaire	
ÉPIAISON	8 mai	

Excellent démarrage précoce au printemps capable d'assurer une forte coupe d'ensilage.

Un feuillage très dense avec des tiges très fines, pour plus de pâture facilité par une très faible remontaison et un puissant tallage pour supporter le piétinement. Une morphologie qui renforce sa longévité.

Une excellente comportement en association avec les trèfles. Un parfait équilibre tout le long de l'année et sur 3 ans pour plus de valeur alimentaire.

DOSES DE SEMIS

30 kg/ha en pur

PÉRIODES DE SEMIS


- > Du 15 mars à fin avril
- > Du 15 août au 15 novembre

UNE MASSE FOLIAIRE IMPRESSIONNANTE



LE PARFAIT ÉQUILIBRE Entre Fauche-pâture

CARACTÈRES AGRONOMIQUES



Sources CTPS

RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE

		LACTICKA	TÉMOIN
Pluriannuel	1 ^{ère} coupe (A2+A3)	14,1	13,6
	Printemps (A2+A3)	22,2	21,5
	Été-automne (A2+A3)	6	5,7

Source: CTPS. Témoin = (Enduro + Bahia)/2

ASSOCIATIONS POSSIBLES



RECOMMANDATIONS CULTURALES

Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface Profondeur de semis optimale : 1 cm - Rouler après semis Surveiller la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire

Fertilisation: En fonctions des besoins de la culture et des analyses

de sols

