



IDENTIFICATION

PLOÏDIE	tétraploïde
TARDIVETÉ	tardif
PÉRENNITÉ	5 ans
ÉPIAISON	3 juin
SOUPLESSE	70 jours

Selectionné pour son rendment élevé en fourrage de qualité au printemps et ses repousses d'automne.

Il offrira un fourrage de qualité pendant plusieurs années renforcée par sa très bonne résistance aux maladies.

Une meilleure valorisation des cycles de pâturage de par son démarrage précoce en sortie d'hiver et sa dynamique de repousse.

DOSES DE SEMIS

30 kg/ha en pur

PÉRIODES DE SEMIS

- > Du 15 mars à fin avril
- > Du 15 août au 15 novembre

UN DÉPART EN Végétation Précoce

UN FOURRAGE DE QUALITÉ PENDANT PLUSIEURS ANNÉES UNE SOUPLESSE D'EXPLOITATION IMPORTANTE

CARACTÈRES AGRONOMIQUES



RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE

		MACARENA	TÉMOIN
Année 1	Total A1	4,3	3,9
Pluriannuel	1 ^{ère} coupe (A2+A3)	4,04	3,5
	Printemps (A2+A3)	13,78	12,84
	Été-Automne (A2+A3)	5,25	4,9

Source: CTPS. Témoin = (Belcampo+ Kerval + Ventoux)/3)

ASSOCIATIONS POSSIBLES





T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

MACARENA (20KG)



CONTROL REPORT (10KG)

MACARENA (15 à 20KG)



 ♣ RGA 2N (7 À 10KG)
 ♣ T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

MACARENA (10KG)



◆ RGA 2N (5KG) ◆ F. DES PRÈS (10KG)
◆ T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)



Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface **Profondeur de semis optimale :** 1 cm - Rouler après semis **Surveiller** la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire

Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses

de sols

