



Memento 2026

Céréales à paille et protéagineux



Semences
de France

INTELLIGENCE
AGRICOLE

L'édition 2026

Semences de France et ARVALIS sont heureux de vous proposer la 28^{ème} édition du Mémento des Semences.

Partenaires depuis de nombreuses années, Semences de France et ARVALIS mettent en commun leur expertise dans le domaine des semences certifiées autogames et vous proposent ce document-référence.

Chaque année, plus de 60 nouvelles variétés de céréales et protéagineux sont inscrites. Les critères de sélection sont d'ordre

- Agronomique (rendement, précocité, tolérance aux maladies...),
- Technologique (qualité boulangère, brassicole...)

ARVALIS étudie l'ensemble des nouvelles variétés inscrites en France pour confirmer leurs caractéristiques, leurs valeurs agronomiques et technologiques dans la continuité des épreuves d'inscription. L'acquisition de références dans la durée (2 années de Post-Inscription) et une grande diversité de situations permettent d'apprécier la régularité des comportements aux facteurs limitants.

Les résultats sont valorisés sous forme de tableaux de comparaison des caractéristiques, de préconisations appropriées aux différents débouchés et contextes de production (zones de cultures et itinéraire cultural), ainsi que des recommandations de leur conduite.



Semences de France organise la production et la commercialisation des semences certifiées de céréales à paille et de protéagineux auprès de ses 48 coopératives actionnaires. A travers son réseau VARIETOSCOPE, Semences de France teste les nouvelles variétés dans toutes les situations pédoclimatiques et permet ainsi de mieux cerner leur adaptation régionale.

Semences de France avec ses coopératives actionnaires est un acteur majeur de la distribution des céréales à paille et protéagineux en France.

Nous remercions nos divers partenaires pour leur aide et leurs précieuses références (GEVES, GNIS, Terres Inovia, FranceAgriMer, Ministère de l'Agriculture, Malteurs et Brasseurs de France, CFSI, ANMF, Obtenteurs, ...).

Retrouvez le Mémento interactif sur le site
www.semencesdefrance.com/memento2026
ou via votre smartphone en scannant ce code



Sommaire

| | |
|----------------|---|
| Sommaire | 1 |
|----------------|---|

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MARCHÉS

| | |
|---|----|
| Répartition des surfaces de blé tendre selon la qualité ... | 4 |
| Qualité des récoltes | 5 |
| Surfaces en multiplication de semences | 6 |
| Blé tendre d'hiver : surface emblavée | 7 |
| Blé tendre d'hiver : rendement | 8 |
| Blé dur d'hiver : surface emblavée | 9 |
| Blé dur d'hiver : rendement | 10 |
| Orge d'hiver : surface emblavée | 11 |
| Orge d'hiver : rendement | 12 |
| Céréales à paille - Tonnages conditionnés | 13 |
| La gamme des hybrides | 16 |

CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

| | |
|---|----|
| Connaître les variétés pour décider | 20 |
| Inscriptions CTPS | 21 |
| Blé tendre d'hiver | 23 |
| Blé tendre d'hiver et de printemps | 28 |
| Blé tendre d'hiver - Blé Améliorant ou de Force (BAF) ... | 29 |
| Blé tendre d'hiver - BIO | 31 |
| Blé tendre d'hiver : besoin en azote - coeff b et bq11,5% | 33 |
| Blé tendre : précocité des variétés | 34 |
| Orge d'hiver 2 rangs | 36 |
| Orge d'hiver 6 rangs | 37 |
| Orge d'hiver 2 rangs - 6 rangs : précocité des variétés | 39 |
| Blé dur | 40 |
| Blé dur : précocité des variétés | 42 |
| Triticale | 43 |
| Triticale : précocité des variétés | 45 |
| Avoine d'hiver | 46 |
| Orge de printemps | 47 |
| Avoine de printemps | 48 |
| Féveroles d'hiver | 49 |
| Féveroles de printemps | 50 |
| Lupin d'hiver et de printemps | 51 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Pois protéagineux d'hiver | 52 |
| Pois protéagineux de printemps | 53 |
| Soja | 55 |

LISTE DE VARIÉTÉS RECOMMANDÉES

| | |
|--|----|
| Blés Meuniers 2026 | 59 |
| CFSI - Intercéréales - Malteurs et Brasseurs de France ... | 60 |

PROTECTION DES SEMENCES

| | |
|--|----|
| Campagne 2025/2026 | 63 |
| Caractéristiques et informations réglementaires | 64 |
| Lutte contre les maladies par le traitement des semences ... | 66 |
| Lutte contre les maladies foliaires et les ravageurs par le traitement des semences | 68 |
| Protection des semences protéagineux | 69 |

ARVALIS

| | |
|---------------------------|----|
| Recherche appliquée | 70 |
|---------------------------|----|

SEMENCES DE FRANCE

| | |
|--------------------------|----|
| Semences de France | 75 |
|--------------------------|----|

BLÉ TENDRE D'HIVER

NOUVEAUTÉ 115.0 %* la meilleure cotation

RGT ARPEGGIO

L'hymne à la performance !

- Blé ½ précoce à ½ tardif (6) à finition rapide
- Profil maladies du feuillage exceptionnel
- Sécurité PS et Protéines

* Cotation rendement en % des témoins officiels réseau 1 du CTPS - récoltes 24 et 25



BPS
VO



BONUS
SEPTORIOSE



TOLÉRANT
MALADIES

ragt-semences.fr

Think SOLUTIONS Think RAGT - Pensez SOLUTIONS Pensez RAGT

Image garantie par IA



think
SOLUTIONS
think RAGT

BLÉ TENDRE D'HIVER

BPS

VO_p

GRIFONDOR

Bon potentiel de rendement

Très bon profil maladies (feuillage et épi) et excellente qualité de grain

Tolérant chlortoluron et piétin verse

Résistant mosaïques et cécidomyies orange



www.unisigma.com

Variété distribuée par




Semences
de France

www.semencesdefrance.com



UNISIGMA
RECHERCHE & CRÉATION VARIÉTALE

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MARCHÉS



* Avant 2021 : Inconnu = Variétés pures dont la valeur d'usage est inconnue + mélanges interspécifiques + mélanges intraspécifiques

À partir de 2021 : Inconnu = Variétés pures dont la valeur d'usage est inconnue + mélanges interspécifiques.

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MARCHÉS

Exigences requises pour la fabrication de différents produits de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie

| | Biscuit | Pain courant | Pain cru surgelé | Brioche | Croissant frais | Croissant surgelé |
|-----------|---------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| PROTÉINES | < 11% | > 11% | > 11% | > 11,5% | > 11,5% | 12-14% |
| W | < 150 | > 150 | > 180 | > 230 | > 250 | 250-400 |
| P/L | < 0,8 | 0,5 - 2,0 | 0,6 - 2,0 | 0,6 - 2,0 | 0,6 - 2,0 | 0,6 - 0,7 |
| HAGBERG | - | 200-250 | 250-300 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |

Une exigence croissante

Source : enquête ARVALIS auprès des utilisateurs. **En gras**, mise à jour en février 2020.

Exemples de cahiers des charges à l'export

| | Maroc | Egypte | Espagne | | Italie | |
|-----------|--------------------|---------------------|-------------|---------|-------------------|----------|
| | Pain de type arabe | Pain de type Tanoor | Pain commun | Chapata | Pain traditionnel | Ciabatta |
| PROTÉINES | 11% | 11,5% | 10 - 12 % | >11% | 11,5% | >12% |
| W | 160 | NS* | 120-150 | 250 | 170-220 | 220-250 |
| P/L | > 0,5 | NS* | 0,3-0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| HAGBERG | 225-250 | 220-250 | 250-300 | >250 | >240 | >250 |
| PS | 77 kg/hl | 78 kg/hl | NS* | NS* | NS* | NS* |
| HUMIDITÉ | 14% | 13% | NS* | NS* | NS* | NS* |

* Non Spécifié

Source : enquête ARVALIS auprès des utilisateurs

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MARCHÉS



| SURFACES DE MULTIPLICATIONS (en hectares) | Surface 2020 | Surface 2021 | Surface 2022 | Surface 2023 | Surface 2024 | Surface 2025 (provisoire) |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| AVOINE HIVER | 1 139 | 1 599 | 1 710 | 1 505 | 1 126 | 1 317 |
| BLE DUR | 6 556 | 7 712 | 7 893 | 7 393 | 6 531 | 5 684 |
| BLE TENDRE D'HIVER | 67 558 | 67 849 | 66 764 | 66 992 | 64 836 | 65 946 |
| EPEAUTRE | 422 | 719 | 759 | 497 | 136 | 282 |
| ORGE HIVER | 21 186 | 21 240 | 19 345 | 20 138 | 19 335 | 20 995 |
| SEIGLE | 2 872 | 3 293 | 2 438 | 2 198 | 2 192 | 1 829 |
| TRITICALE | 7 089 | 8 092 | 7 345 | 7 584 | 6 798 | 7 636 |
| AVOINE PRINTEMPS | 1 327 | 1 565 | 1 489 | 1 197 | 1 191 | 1 340 |
| BLE TENDRE PRINTEMPS | 1 618 | 1 950 | 1 456 | 1 394 | 1 296 | 1 323 |
| ORGE PRINTEMPS | 13 373 | 12 720 | 12 269 | 11 804 | 12 064 | 12 713 |
| RIZ | 267 | 181 | 124 | 167 | 175 | 260 |
| SARRASIN | 1 694 | 1 938 | 1 626 | 2 383 | 2 612 | 2 173 |
| FEVEROLE HIVER | 1 935 | 2 311 | 1 943 | 1 877 | 2 045 | 2 738 |
| LUPIN HIVER | 290 | 296 | 86 | 89 | 64 | 99 |
| POIS PROTEAGINEUX HIVER | 2 250 | 3 104 | 2 872 | 3 445 | 3 110 | 2 060 |
| FEVEROLE PRINTEMPS | 1 801 | 1 354 | 987 | 1 074 | 1 077 | 1 276 |
| LUPIN PRINTEMPS | 204 | 353 | 325 | 159 | 176 | 240 |
| POIS PROTEAGINEUX PRINTEMPS | 5 070 | 5 404 | 5 627 | 5 371 | 4 735 | 4 438 |

ND = Non disponible

Source : Semae - mars 2026

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MARCHÉS

Surface emblavée en blé tendre d'hiver par département (x1 000 ha) (superficie 2026)





| Année | Superficie totale * Blé tendre d'hiver (ha) |
|-------|--|
| 2017 | 4 948 207 |
| 2018 | 4 866 337 |
| 2019 | 4 983 221 |
| 2020 | 4 226 344 |
| 2021 | 4 960 464 |
| 2022 | 4 671 845 |
| 2023 | 4 742 898 |
| 2024 | 4 177 126 |
| 2026 | +2,8% 4 588 952 |

* en France métropolitaine

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MARCHÉS

Rendements en blé tendre d'hiver par département (en quintaux) (récolte 2025)





| Année | Rendement | Production * |
|-------------|-------------------------|----------------------|
| | Blé tendre hiver (q/ha) | Blé tendre hiver (t) |
| 2017 | 73,7 | 36 468 623 |
| 2018 | 69,8 | 33 955 378 |
| 2019 | 79,1 | 39 409 446 |
| 2020 | 68,5 | 28 951 265 |
| 2021 | 71,1 | 35 250 487 |
| 2022 | 71,8 | 33 537 919 |
| 2023 | 73,8 | 34 996 195 |
| 2024 | 60,9 | 25 450 229 |
| 2025 | 74,2 | 33 127 363 |

* en France métropolitaine

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MARCHÉS

Surface emblavée en blé dur d'hiver par département (x1 000 ha) (superficie 2026)





| Année | Superficie totale * Blé dur hiver (ha) |
|-------------|---|
| 2017 | 361 331 |
| 2018 | 347 261 |
| 2019 | 238 657 |
| 2020 | 218 407 |
| 2021 | 285 312 |
| 2022 | 245 216 |
| 2023 | 229 526 |
| 2024 | 209 420 |
| 2025 | 197 305 |
| 2026 | -0,6% 196 192 |

* en France métropolitaine

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MARCHÉS

Surface emblavée en orge d'hiver par département (x1 000 ha) (superficie 2026)





| Année | Superficie totale * Orge d'hiver (ha) |
|-------------|--|
| 2017 | 1 397 894 |
| 2018 | 1 283 591 |
| 2019 | 1 305 222 |
| 2020 | 1 180 045 |
| 2021 | 1 199 431 |
| 2022 | 1 294 425 |
| 2023 | 1 367 274 |
| 2024 | 1 244 567 |
| 2025 | 1 192 535 |
| 2026 | +5,3% 1 256 142 |

* en France métropolitaine

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MARCHÉS

Rendements en orge d'hiver par département (en quintaux) (récolte 2025)



| Année | Rendement Orge hiver (q/ha) | Production * Orge hiver (t) |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2017 | 65,0 | 9 083 763 |
| 2018 | 63,4 | 8 140 441 |
| 2019 | 70,8 | 9 247 366 |
| 2020 | 55,2 | 6 515 302 |
| 2021 | 68,5 | 8 215 332 |
| 2022 | 65,5 | 8 476 636 |
| 2023 | 70,9 | 9 694 874 |
| 2024 | 55,8 | 6 948 735 |
| 2025 | 70,0 | 8 349 026 |

* en France métropolitaine

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES MARCHÉS

| Type de conditionnement | 2022/2023 | | 2023/2024 | | 2024/2025 | | 2025/2026 | |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | quintaux | % | quintaux | % | quintaux | % | quintaux | % |
| 20 kg | 46 060 | 1,0% | 36 079 | 0,7% | 42 602 | 1,0% | 30 263 | 0,7% |
| 25 kg | 704 803 | 15,1% | 660 398 | 13,6% | 548 332 | 12,7% | 504 716 | 12,3% |
| 40 kg (et 35) | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 50 kg | 1 690 | 0,0% | 1 467 | 0,0% | 5 | 0,0% | 27 | 0,0% |
| Total sacs | 752 553 | 16,1% | 697 944 | 14,4% | 590 939 | 13,7% | 535 006 | 13,0% |
| 400 kg | 188 | 0,0% | 166 | 0,0% | 944 | 0,0% | 1 244 | 0,0% |
| 500 kg | 24 440 | 0,5% | 31 490 | 0,7% | 43 685 | 1,0% | 24 920 | 0,6% |
| 600 kg | 1 027 644 | 22,0% | 1 079 742 | 22,3% | 951 432 | 22,1% | 983 478 | 23,9% |
| 1000 kg | 8 090 | 0,2% | 16 130 | 0,3% | 6 560 | 0,2% | 10 690 | 0,3% |
| 1200 kg | 252 | 0,0% | 624 | 0,0% | 195 | 0,0% | | 0,0% |
| Total big bags | 1 060 614 | 22,7% | 1 128 152 | 23,3% | 1 002 816 | 23,3% | 1 020 332 | 24,8% |
| doses 400 000 gr | 892 | 0,0% | 633 | 0,0% | 999 | 0,0% | 1 004 | 0,0% |
| doses 500 000 gr | 906 412 | 19,4% | 932 801 | 19,3% | 778 016 | 18,1% | 726 498 | 17,7% |
| doses 600 000 gr | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | 334 | 0,0% |
| doses 750 000 gr | 278 | 0,0% | 941 | 0,0% | 1 581 | 0,0% | 1 558 | 0,0% |
| doses 1 000 000 gr | | 0,0% | | 0,0% | 34 | 0,0% | 11 | 0,0% |
| Big doses (12M-13M-15M) | 1 954 659 | 41,8% | 2 080 247 | 43,0% | 1 930 939 | 44,9% | 1 830 611 | 44,5% |
| Total doses | 2 862 241 | 61,2% | 3 014 622 | 62,3% | 2 711 569 | 63,0% | 2 560 016 | 62,2% |
| Conteneurs | 14 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| Total | 4 675 422 | 100,0% | 4 840 718 | 100,0% | 4 305 324 | 100,0% | 4 115 354 | 100,0% |

Une stratégie de désherbage des céréales à paille

RÉFLÉCHIE ET ANTICIPÉE
POUR ÊTRE EFFICACE ET
PRÉVENIR LES RÉSISTANCES

Pour télécharger l'outil
ADAMA, scannez le
QR code ici



BIEN CONNAÎTRE
LA FLORE ADVENTICE



PRIVILÉGIER LES
INTERVENTIONS
À L'AUTOMNE




ADOPTER LES
BONNES PRATIQUES



ALTERNER ET ASSOCIER
LES FAMILLES CHIMIQUES



UTILISER
NOTRE OAD



et pour les produits ça se passe ici



Pourquoi choisir un herbicide à base de CHLORTOLURON ?

1

Seul représentant du groupe HRAC 5 pour le désherbage des céréales, aucune résistance en France à ce jour

2

CONSTEL
Utilisable sur sols drainés en post-lévée

3

Utilisable sur blés comme sur orges

4

Des atouts dans la lutte contre les graminées et certaines dicotylédones résistantes

CONSTEL® & TABLO® 700

Souplesse d'emploi de la pré jusqu'au 28 fév




Groupe
HRAC N°5
le moins utilisé en désherbage

2 atouts à base de CHLORTOLURON pour SÉCURISER votre programme de désherbage.

CONSTEL® AMM N° 2070184 - SC-Suspension concentrée - 25 g/L de Diflufenican + 400 g/L de Chlortoluron.
TABLO 700® AMM N° 9800100 - SC-Suspension concentrée - 700 g/L de Chlortoluron.

CONSTEL® ATTENTION

H351 : Susceptible de provoquer le cancer.
H361d : Susceptible nuire au fœtus
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208 : Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



TABLO 700® ATTENTION

H351 : Susceptible de provoquer le cancer.
H361d : Susceptible nuire au fœtus.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208 : Contient du 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez www.adama.com et/ou www.phytodata.com. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. © Marque déposée Adama France s.a.s.- RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. FÉVRIER 2026. Annule et remplace toute version précédente. Ceci n'est pas une fiche technique, veuillez donc vous référer aux étiquettes des produits.










ADAMA France s.a.s | 33 rue de Verdun | 92156 Suresnes Cedex | Tél. : 01 41 47 33 33 | www.adama.com

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

La gamme des Hybrides

Orge d'hiver

| |  SY FASTNET PROFIL SECURE+ |  SY PANTHEON Hyvido [®] Neo |  SY KESTREL Hyvido [®] Neo |  SY COLYSE00 PROFIL SECURE+ |  SY BLUETOOTH ESQUIVE+ |  SY LOONA PROFIL SECURE+ |  SY SCOOP PROFIL SECURE+ |
|-----------------------|---|--|---|---|--|--|---|
| Alternativité | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| Précocité épiaison | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 |
| Hauteur | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| Résistance à la verse | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Résistance au froid | 7 | 7 | (5) | (7) | (4,5) | (5) | 6 |
| Oidium | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Rouille naine | 7 | 6 | 5 | 7* | 6 | 7 | 7 |
| Mosaïque - Y1 | R | R | R | R | R | R | R |
| Rhynchosporiose | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Helminthosporiose | 6* | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Ramulariose | (7) | (7) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| JNO | - | Résistante | Résistante | - | - | - | - |
| Pieds chétifs - WDV | - | Tolérante | Tolérante | - | - | - | - |
| Teneur en protéines | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PS | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6 |
| Calibrage | 7 | 7 | 9 | 7* | 8 | 7* | 8* |

PROFIL SECURE+ Les variétés PROFIL SECURE PLUS sécurisent le potentiel de votre culture grâce à un meilleur profil variétal sur l'ensemble des maladies permettant d'optimiser les traitements fongicides (Suppression du T1 possible).


ESQUIVE+ Les variétés ESQUIVE PLUS améliorent la résilience face aux aléas climatiques grâce à un phénomène d'esquive. (Limite l'impact des stress hydriques et l'échaudage de fin de cycle).

METHA+ Les variétés METHA PLUS sont adaptées à la méthanisation (Rendement méthanogène, durée de cycle, comportement aux maladies). Voir le guide sur notre site : <https://www.semencesdefrance.com/methaplus/methanisation>


Hyvido[®] Neo Les variétés HYVIDO NEO sont résistantes à la JNO et tolérantes à la WDV.

Source ARVALIS
() à confirmer
* notes Semences de France

Seigle

| |  KWS TAYO METHA+ |
|-----------------------|--|
| Alternativité | 1 |
| Précocité épiaison | 7 |
| Précocité montaison | - |
| Hauteur | 7,5 |
| Résistance à la verse | 7 |
| Résistance au froid | 8 |
| Oidium | 7,5 |
| Rouille brune | 6 |
| Ergot | 8 |
| Teneur en protéines | 5 |
| Poids spécifique | 7 |
| PMG | 4 |
| Hagberg | 8 |
| Amylogramme | 8,5 |

Triticale

| |  HYT PRIME METHA+ |
|-----------------------|---|
| Alternativité | 7 |
| Précocité épiaison | 7 |
| Hauteur | 6 |
| Résistance à la verse | 6,5 |
| Résistance au froid | 6 |
| Germination sur pied | 4 |
| Oidium | 7 |
| Rouille brune | 8 |
| Rouille jaune | 7 |
| Piétine verse | 6 |
| Teneur en protéines | 9 |
| Poids spécifique | 5 |
| Viscosité | 4 |
| Amylogramme | 8,5 |

Funny

Blé tendre d'hiver

NOUVEAUTÉ



BPS - V0p 26

Blé Panifiable

Supérieur



Potentiel très élevé

**Tolérance
piétin-verse**

PS très élevé

Infos +



**FLORIMOND
DESPREZ**

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques et écologiques ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France. // S.A.S. Maison Florimond Desprez - RCS 458 500 170 - Crédits photos: shutterstock / Florimond Desprez - Mars 2026

Orge 2 rangs d'Hiver - Fourragère

ATOMIC

Une explosion
de rendement !

- Excellente tenue de tige
- Très bon PS
- Très bon comportement maladies



SECOBRA
RECHERCHES

LES PRÉFÉRÉES
Semences
de France

JEU
X

SECOBRA
RECHERCHES

Scannez le QRcode,
répondez à 3 questions
et tentez de
gagner le gros lot !



TRITICALE

Requin



COTATION CTPS
114,7%
en % des témoins CTPS*



- +** Meilleure inscription 2025
- +** Triple utilisation : grain, méthanisation, AB
- +** Bonne résistance à la verse
- +** Bonne tolérance à la rouille jaune



agriobtentions.fr

* En % des témoins CTPS 2024-2025. Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques et écologiques ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou soulés actuellement connus et étudiés en France - Crédit photo : AGRI OBTENTIONS

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Vous trouverez dans les pages suivantes la synthèse des caractéristiques des variétés en matière de :

- **Précocité et morphologie,**
- **Résistances aux accidents telles que la verse, les maladies, etc.,**
- **Qualité technologique.**

Quant aux résultats de rendements des variétés en modalités bien protégées vis-à-vis des maladies et non traitées, vous les trouverez sur le site internet : arvalis-infos.fr .

Les races de maladies évoluent chaque année. Ces évolutions peuvent parfois entraîner des modifications de niveau de résistance de certaines variétés. Comme les contournements sont difficiles à prévoir, il est recommandé de rester vigilant notamment sur les rouilles et l'oïdium.




Les informations proviennent du CTPS/GEVES pour les inscriptions de l'année et d'ARVALIS qui confirme, ajuste et actualise les notes à l'issue des essais de Post-Inscription. Sont également rassemblés les avis des utilisateurs comme l'ANMF, le CBMO et le CFSI.

Les variétés retenues pour la présentation de leurs caractéristiques dans le Mémento sont choisies sur la base de :

- Leur surface de multiplication. Un minimum de surface est requis en fonction de l'espèce, du marché, et de l'âge de la variété.
- Leur année d'inscription. Les deux dernières promotions d'inscription sont retenues dès lors qu'elles font l'objet d'une démarche de développement.

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Blé Tendre d'Hiver 1/3

| Variétés | Représentant | Référence |
|--|--------------|----------------|
| ALLSOME | LD | LD 2 BN 18007 |
| BATMAN  | SEC | SCWF 2362 |
| CELEBI | LD | LD 2 BS 18307 |
| CORLEONE | SEC | SCWF 2360 |
| DUMBLEDDOR  | UNI | UN 038 R 21 |
| EXCALIBUR | SEC | SCWF 2357 |
| FUNNY  | FD | FDN 22 WW 0188 |
| GANDY | AO | AO 23257 |
| GEEK ^(AB) | AO | RE 20025 |
| GIVERNY | AO | AO 22751 |
| GRIFONDOR  | UNI | UN 8195 R 34 |
| GYROS ^(AB) | AO | RE 19106 |
| KADIX | DSV | DSV 23096 |

Blé Tendre d'Hiver 2/3

| Variétés | Représentant | Référence |
|---------------|--------------|---------------|
| KANSAS | DSV | DSV 23401 |
| KASSIAN | DSV | DSV 23178 |
| KWS AUSTRALE | KWM | KM 23116 |
| KWS FOUDE | KWM | KM 23138 |
| LG ACOLYTE | LG | LGWF 21-53901 |
| LG AIRFORCE | LG | LGWF 21-65005 |
| LG ALISTAIR | LG | LGWF 22-6894 |
| LG ALLURE | LG | LGWF 22-8222 |
| LG ANTIGONE | LG | LGWF 21-2112 |
| LG AVALON | LG | LGWF 21-89329 |
| LID CORDEL | CSP | LDW 23614 |
| LID FREESTYLE | CSP | LDW 23760 |
| LID HIPHOP | CSP | LDW 23506 |


Blé Tendre d'Hiver 3/3

| Variétés | Représentant | Référence |
|--|--------------|--------------|
| LID OBADE | CSP | LDW 23620 |
| LID SALTAREL  | CSP | LDW 23711 |
| MAGNETIK | RAG | RW 22335 |
| RGT ARPEGGIO  | RAG | RW 22118 |
| RGT SEDUCTO | RAG | RW 22365 |
| RGT SPACIO | RAG | RW 22341 |
| SU JOGGER | SU | BE-HPF 23-19 |
| SU SNIPPER  | SU | BE-HPF 23-03 |
| SU TUCSON | SU | APB 006-088 |
| VALIDUS ^(AB) | LD | SZD 1847 |

Blé Tendre d'Hiver Hybride

| Variétés | Représentant | Référence |
|-------------|--------------|----------------|
| BHW23BW0020 | BASF | BHW 23 BW 0020 |
| SY SPHYNX | SY | SY 8223147 |
| SY XANTHIS | SY | SY 8223146 |

Blé Dur

| Variétés | Représentant | Référence |
|---|--------------|-----------|
| KALYPSUR | RAG | RD 20018 |
| RGT DEMESUR  | RAG | RD 21087 |
| RGT TOPALLUR | RAG | RD 21088 |

 variétés préférées Semences de France




^(AB) : Variété évaluée dans les conditions de l'agriculture biologique

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Orge de Printemps

| Variétés | Représentant | Référence |
|--------------|--------------|-----------------|
| AC PICTURE | FD | AC 20-542-51 |
| CHISTERA | SEC | SC 23 E 0435 |
| MONETA | AO | BR 15526 B 1 |
| SU CHARLOTTE | SU | NORD 23-1117 GS |
| SY REMOA | RAG | SY 423538 |

Orge d'Hiver 2 rangs

| Variétés | Représentant | Référence |
|--|--------------|----------------|
| ATOMIC  | SEC | SC 21 B 5178 |
| ETERNITY  | AO | MA 15260 |
| KWS LEGENDIS | KWM | KWS-B 169 |
| LG CAPORAL | LG | LGBU 21-7348 B |
| MAJORETT  | UNI | UN 4224 |

Orge d'Hiver 6 rangs

| Variétés | Représentant | Référence |
|----------------|--------------|--------------|
| KWS DIVINATRIS | KWM | KM 18 GE 099 |
| HOPINEL | SEC | SC 22 A 1016 |
| LAROCHEL | SEC | SC 22 A 1014 |
| MAELYS | UNI | UN 4656 |
| TITANEL | SEC | SC 21 A 1330 |


Orge d'Hiver hybride 6 rangs

| Variétés | Représentant | Référence |
|--------------|--------------|-----------|
| SY COOPERNIC | SY | SY 223336 |
| SY FASTNET | SF | SY 223338 |
| SY PANTHEOON | SF | SY 223356 |

Triticale

| Variétés | Représentant | Référence |
|---|--------------|------------------|
| GALAXOR  | LD | LD 2 TR 21527 |
| RAFTING  | AO | CA 2354 |
| RALLY | LG | CA 2365 |
| REQUIEM | AO | CA 2271 |
| RGT KEZAC | RAG | RT 20115 |
| RORKAL | AO | CA 2165 |
| SU PAPYRUS | SU | NORD 23-7719 TIW |
| TERRASTAR | LD | LD 1 TR 21080 |
| TRIATTACK | LD | LD 2 TR 21515 |
| TRISCORE | FD | FDN 20 WT 0035 |

Avoine de printemps

| Variétés | Représentant | Référence |
|---|--------------|------------------|
| CANDICE  | AO | AO 16011 |
| RGT KAOLITE | RAG | RV 23502 |
| TIMPANI | AUT | 045 SO 2013 AU 5 |

Avoine d'hiver

| Variétés | Représentant | Référence |
|--------------|--------------|-----------|
| KWS ALEZANT | KWS | KM-WON 4 |
| RGT CRAWFORD | RAG | RV 22002 |

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | | Qualité technologique | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----|-----|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Aristation (b=barbu / nb=non barbu) | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Piétin verse ⁽³⁾ | Oïdium* | Rouille jaune* | Septoriose tritici | Rouille brune* | Fusariose (f.,graminearum) | Accumulation DON | Complexe xMosaïques ⁽³⁾ | Cécidomyies Orange | JNO | Chlortoluron | PMG | PS | Protéines (GPD) ⁽¹⁾ | Protéines | W à 11,5% de protéines | P/L à 11,5% de protéines | Classe qualité | ANMF VRM / BPMF ⁽²⁾ | CEPP / dose de 500 000 graines ⁽⁴⁾ |
| FD | ACADEMY | 2024 | b | 3 | 2 | 7 | 6 | 3,5 | 6,5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6,5 | 4 | 5 | 4 | | R | | S | 6 | 6 | 6 | 4 | 155-195 | 0,7-1,5 | BPS | VRMp | 0,11 |
| FD | ACCOMPLY | 2025 | nb | 4 | 2 | 6 | 7,5 | 4 | 6,5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5,5 | | | T | (4) | 5 | 6 | 4 | 170-185 | 0,7-1,0 | BPS | BPMFp | 0,05 | |
| LD | ACROBATIC | HR-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| AO | AGEN | 2025 | b | 4 | 5 | 8 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4,5 | 6,5 | | | S | 3 | 7 | 7 | 8 | 165-245 | 0,5-1,0 | BPS | VOc | 0 | |
| LD | ALLSOME | 2026 | nb | 2 | | 5,5 | 7,5 | 4 | 6,5 | | 2 | (7) | 7 | 7 | 7 | 5 | | | | T | | 7 | (7) | (6) | 175-235 | 0,4-1,0 | BPS | VOp | 0,05 | |
| LG | APACHE | 1998 | nb | 4 | 3 | 7 | 7 | 3,5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4,5 | 4 | 7 | 6,5 | S | | T | 5 | 6 | 4 | 5 | 160-210 | 0,3-1,0 | BPS | VRMp ^{EXT} | 0,05 | |
| LD | ARCACHON | 2021 | nb | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6,5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5,5 | S | | T | 5 | 6 | 4 | 2 | 185-225 | 0,7-1,5 | BPS | BPMFp | 0,05 | |
| LG | ARKEOS | 2011 | nb | 2 | 2 | 7 | 7,5 | 3,5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | S | | S | 3 | 4 | 4 | 4 | 70-90 | 0,3-0,4 | BB | VRMb | 0 | |
| LD | ARTIMUS | AT-20 | b | 4 | 4 | 7,5 | | 4,5 | 6,5 | | | (7) | 5 | 4 | 7 | | | | | | (6) | 9 | 7 | 9 | | | | | | 0,05 |
| SEC | BALZAC | 2022 | b | 3 | 4 | 7 | (6,5) | 4 | 5,5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5,5 | 5 | | | T | 4 | 7 | 6 | 5 | 115-165 | 0,7-1,5 | BPS | VRMp | 0,05 | |
| SEC | BATMAN | 2026 | b | 2 | | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | | 7 | | 7 | 6,5 | 7 | 4,5 | | | | | | 7 | (8) | (6) | 140-210 | 0,6-1,0 | BP | | | 0,05 |
| SEC | BELZEBUTH | 2025 | b | 3 | (3) | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4,5 | 3 | | R | | T | (4) | 6 | 5 | 2 | 150-170 | 0,7-1,3 | BP | BPMFp ^{EXT} | 0,01 |
| FD | CELEBRITY | 2022 | nb | 5 | 4 | 7 | (5,5) | 3,5 | 6,5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | R | R | T | 7 | 5 | 6 | 2 | 130-190 | 0,6-1,3 | BPS | BPMFp ^{EXT} | 0,01 | |
| UNI | CHAMDOR | 2025 | nb | 3 | 3 | 7 | 6,5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5,5 | 5,5 | R | | S | (7) | 6 | 8 | 5 | 180-235 | 0,6-0,9 | BPS | | | 0,1 |
| SU | CHEVIGNON | 2017 | nb | 3 | 2 | 6 | (6,5) | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | S | S | T | 5 | 5 | 5 | 2 | 165-210 | 0,5-1,1 | BPS | BPMFp | 0,05 | |
| UNI | CONQUISTADOR | 2025 | b | 3 | 3 | 7 | 6,5 | 3,5 | 7 | (4) | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6,5 | 6 | R | R | T | (3) | 7 | 6 | 4 | 175-235 | 0,3-1,0 | BPS | VRMp | 0,11 | |
| UNI | DUMBLEDDOR | 2026 | b | 3 | | 5,5 | 6 | 4,5 | 7 | | 6 | (6) | 6 | 7,5 | 8 | 5,5 | | | | T | | 8 | (9) | (5) | 140-210 | 0,4-0,7 | BPS | VOp | 0,11 | |
| CSP | EKONOM | AT-20 | b | (5) | (4) | 5,5 | | 5,5 | (5,5) | | | | (7) | 5,5 | 4 | | | | | T | (6) | (7) | 6 | 9 | 230-300 | 1,3-1,9 | | | | 0 |
| CSP | ENERGO | AT-09 | b | (3) | | 6,5 | | 6,5 | (6) | | | | | 5 | 5,5 | 5 | | | | T | 6 | 9 | 7 | 9 | | | | | | 0 |
| CSP | EVERY | AT-19 | b | (3) | 3 | 6 | | 5,5 | (4) | | | | | 8 | (7) | 6 | | | | T | | 7 | (7) | (9) | | | | | | 0 |
| UNI | FABULOR | 2024 | nb | 3 | (2) | 6 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | R | | T | 9 | 8 | 9 | 8 | 165-235 | 0,7-1,3 | BPS | VRMp | 0,05 | |

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | Qualité technologique | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-----|-----|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| | | | Aristation (b=barbu / nb=non barbu) | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Pléтин verse ⁽³⁾ | Oïdium* | Rouille jaune* | Septoriose tritici | Rouille brune* | Fusariose (f.,graminearum) | Accumulation DON | Complexe xMosaïques ⁽³⁾ | Cécidomyies Orange | JNO | Chloroturon | PMG | PS | Protéines (GPD) ⁽¹⁾ | Protéines | W à 11,5% de protéines | P/L à 11,5% de protéines | Classe qualité | ANMF VRM / BPMF ⁽²⁾ | CEPP / dose de 500 000 graines ⁽⁴⁾ |
| FD | FACILITY ♡ | 2025 | b | 3 | 4 | 7 | 6,5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6,5 | 7 | 5 | 4,5 | | | | T | (5) | 5 | 6 | 2 | 190-240 | 0,7-1,4 | BPS | VRMp | 0,05 |
| FD | FUNNY ♡ | 2026 | b | 3 | 4 | 7 | 5,5 | 4 | (6) | 8 | | 6 | 6,5 | 7 | 5 | | | | | T | | 7 | (6) | (3) | 140-195 | 0,7-1,3 | BPS | VOp | 0,05 | |
| AO | GANDY | 2026 | b | 4 | | 7 | 6 | 3 | (6,5) | | 3 | | 6 | 5,5 | 6 | 4,5 | | R | | | T | | 7 | (8) | (6) | 175-225 | 0,9-1,5 | BPS | VOp | 0,05 |
| AO | GENERIK | 2025 | nb | 3 | 3 | 6 | 7 | 3,5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | | | | | (4) | 6 | 5 | 3 | 140-170 | 0,4-0,5 | BPS | BPMFp | 0,1 |
| AO | GÉOPOLIS | 2025 | nb | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7,5 | 8 | 4,5 | 3,5 | | R | | S | (6) | 4 | 8 | 5 | 215-250 | 0,8-1,2 | BPS | BPMFp | 0,06 |
| AO | GIVERNY | 2026 | b | 5 | | 7 | 8 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | | | | | S | | 5 | (5) | (3) | 165-225 | 0,5-0,8 | BPS | | 0,05 | |
| AO | GREKAU | 2021 | b | 6 | 5 | 7,5 | 7 | 3,5 | 5,5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5,5 | 5 | R | R | | T | 5 | 5 | 7 | 6 | 125-195 | 0,5-0,9 | BPS | VRMp ^{EXT} | 0,06 |
| UNI | GRIFONDOR ♡ | 2026 | b | 4 | | 7 | 6,5 | 3,5 | 6,5 | | 6 | | 7 | 7 | 6 | 6,5 | | R | R | | T | | 7 | (9) | (7) | 200-270 | 0,8-1,1 | BPS | VOp | 0,06 |
| SEC | HANSEL | 2020 | b | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5,5 | | | | T | 2 | 7 | 6 | 5 | 75-125 | 0,2-0,5 | BB | VRMb | 0,05 |
| SU | HYLIGO (h) | 2020 | nb | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5,5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 6,5 | | | S | 7 | 6 | 6 | 2 | 165-200 | 0,6-1,7 | BPS | VRMp | 0 | |
| FD | INTENSITY ♡ | 2023 | b | 3 | 3 | 6,5 | 6 | 3,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | | | R | S | 5 | 6 | 8 | 5 | 140-210 | 0,5-1,3 | BPS | VRMp ^{EXT} | 0,06 |
| SF | JERIKO ♡ | 2023 | b | 4 | 4 | 6,5 | 6 | 3,5 | 6,5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6,5 | | | | R | T | 4 | 7 | 6 | 5 | 125-160 | 0,6-0,9 | BPS | VRMp ^{EXT} | 0,06 |
| UNI | JUNIOR ♡ | 2021 | nb | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6,5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | T | 5 | 7 | 7 | 4 | 180-220 | 0,8-1,8 | BPS | VRMp | 0,05 |
| DSV | KAKTUS ♡ | 2025 | nb | 4 | 3 | 7 | 6,5 | 3,5 | 7 | (4) | 5 | 6 | 7 | 6,5 | 6 | 4,5 | 3,5 | R | R | | T | (5) | 6 | 7 | 3 | 150-215 | 0,8-1,4 | BPS | VRMp | 0,11 |
| DSV | KANSAS | 2026 | nb | 3 | | 7 | 6 | 3 | (7) | | 8 | | 5 | 6,5 | 6 | 5 | | | | R | T | | 5 | (6) | (5) | 225-290 | 1,6-2,6 | BPS | | 0,06 |
| DSV | KAROQUE | 2023 | nb | 3 | 3 | 7 | 7 | 3,5 | 6,5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6,5 | 4 | 4,5 | 5 | | | | T | 6 | 6 | 7 | 5 | 195-230 | 0,9-1,6 | BPS | VRMp | 0,05 |
| DSV | KASSIAN | 2026 | b | 3 | | 6,5 | 6 | 3,5 | 6,5 | | 4 | | 7 | 6 | 4 | 5 | | | | R | T | | 6 | (8) | (6) | 150-205 | 0,9-1,3 | BPS | VOp | 0,01 |
| SEC | KINGKONG ♡ | 2024 | nb | 4 | 2 | 6 | 6,5 | 4 | 5,5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | | | | T | 4 | 7 | 7 | 3 | 170-215 | 0,8-1,3 | BPS | VRMp | 0,05 |
| KWM | KWS ASTRUM | 2023 | nb | 3 | 3 | 6 | 7 | 3,5 | 6,5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | | | | R | T | 3 | 7 | 5 | 3 | 160-210 | 0,6-1,3 | BP | VRMp ^{EXT} | 0,06 |
| KWM | KWS ERRUPTIUM | 2023 | nb | 2 | 2 | 5,5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5,5 | | | | | T | 7 | 6 | 7 | 4 | 120-155 | 0,3-0,7 | BAU | | 0,05 |
| KWM | KWS ÉTOILE ♡ | 2024 | nb | 6 | (1) | 5,5 | 6 | 4 | 6,5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 4 | 5 | 4 | | | | T | (5) | 7 | 6 | 2 | 175-235 | 0,9-1,6 | BPS | BPMFp | 0,05 |

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | | Qualité technologique | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | Aristation (b=barbu / nb=non barbu) | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Piétin verse ⁽³⁾ | Oïdium* | Rouille jaune* | Septoriose tritici | Rouille brune* | Fusariose (f., graminearum) | Accumulation DON | Complexe xMosaïques ⁽³⁾ | Cécidomyies Orange | JNO | Chloroturon | PMG | PS | Protéines (GPD) ⁽¹⁾ | Protéines | W à 11,5% de protéines | P/L à 11,5% de protéines | Classe qualité | ANMF VRM / BPMF ⁽²⁾ |
| KWM | KWS EXTASE | 2018 | nb | 2 | 2 | 6 | (6) | 3,5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 4 | 4 | S | | T | 7 | 5 | 6 | 3 | 145-210 | 0,4-0,9 | BPS | VRMp | 0,1 |
| KWM | KWS Foudre | 2026 | nb | 2 | | 6,5 | 5 | 3,5 | 5,5 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | | | | T | 7 | 7 | 6 | (3) | 145-200 | 0,5-0,9 | BPS | VOp | 0,05 | |
| KWM | KWS GLOBE ♥ | 2025 | nb | 3 | 2 | 5,5 | 7 | 4 | 6,5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4,5 | 5 | | T | (6) | 6 | 6 | 2 | 180-200 | 0,7-1,1 | BPS | VRMp | 0,05 | |
| KWM | KWS MILLESIME ♥ | 2025 | b | 6 | 6 | 7 | 5,5 | 3,5 | 6 | (4) | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6,5 | R | R | T | (5) | 7 | 6 | 3 | 140-155 | 0,6-1,1 | BPS | VRMp ^{EXT} | 0,06 |
| KWM | KWS PARFUM | 2022 | nb | 5 | 4 | 7 | (5,5) | 3,5 | 5,5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 5,5 | | S | 5 | 8 | 5 | 5 | 105-170 | 0,4-1,2 | BPS | VRMp | 0,05 | |
| KWM | KWS PERCEPTUM ♥ | 2022 | nb | 3 | 3 | 6,5 | (7,5) | 3 | 5,5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | | T | 4 | 6 | 6 | 2 | 135-185 | 0,5-1,7 | BPS | VRMp | 0,05 | |
| KWM | KWS SPHERE | 2020 | nb | 2 | 2 | 6,5 | 7,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | R | | T | 8 | 8 | 5 | 4 | 190-220 | 1,0-2,6 | BPS | VRMp | 0,05 |
| LG | LG ABILENE | 2022 | b | 3 | 3 | 7 | (6,5) | 4 | 5,5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | | T | 5 | 7 | 7 | 6 | 175-230 | 1,0-2,0 | BPS | VRMp | 0,05 | |
| LG | LG ABSALON | 2016 | nb | 3 | 3 | 6,5 | (5,5) | 3,5 | 5,5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7,5 | 7 | 5 | 5 | S | | T | 5 | 7 | 5 | 5 | 150-205 | 0,5-1,5 | BPS | VRMp | 0,05 |
| LG | LG ACOLYTE | 2026 | b | 4 | | 6,5 | 7 | 3,5 | 6,5 | | 2 | 7 | 7 | 7 | 5,5 | | | R | | T | | 8 | (6) | (5) | 130-205 | 0,4-1,1 | BPS | | 0,06 |
| LG | LG ACROBAT | 2025 | b | 3 | 3 | 6,5 | 6,5 | 2,5 | 7,5 | 5 | 5 | 6 | | 7 | 5 | 5 | 4 | | T | (4) | 6 | 7 | 4 | 90-120 | 0,2-1,0 | BAU | | 0,1 | |
| LG | LG AERO | 2024 | nb | 3 | (2) | 5 | 6,5 | 3,5 | 6,5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3,5 | 3 | | R | T | (5) | 5 | 5 | 2 | 130-220 | 0,4-1,0 | BPS | BPMFp | 0,06 |
| LG | LG AIKIDO | 2023 | b | 6 | 4 | 7 | 6,5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | | R | S | 5 | 7 | 8 | 6 | 160-255 | 2,1-3,3 | BPS | VRMp | 0,11 | |
| LG | LG AIRFORCE | 2026 | b | 4 | | 7 | 6 | 3 | 6,5 | | 5 | | 7 | 6 | 6 | 5 | | R | | T | | 7 | (6) | (4) | 170-250 | 0,7-1,5 | BPS | VOp | 0,06 |
| LG | LG ALISTAIR | 2026 | b | 2 | | 6,5 | 6 | 3 | 6,5 | | 7 | | 7 | 6,5 | 6 | 4,5 | | | | | | 7 | (8) | (6) | 185-260 | 0,9-1,4 | BPS | | 0,05 |
| LG | LG ALLURE | 2026 | b | 4 | | 7 | 6,5 | 3,5 | 6 | | 7 | | 7 | 6 | 5 | 5,5 | | R | R | | S | 6 | (8) | (3) | 130-170 | 0,5-0,9 | BPS | VOp ^{EXT} | 0,06 |
| LG | LG ANTIGONE | 2026 | b | 3 | | 7 | 5,5 | 3,5 | (6) | | 6 | | 6 | 6,5 | 6 | 5 | | | T | | 6 | (8) | (6) | (2) | 190-290 | 1,3-3,4 | BP | | 0,05 |
| LG | LG ARLEY | 2022 | b | 3 | 3 | 6,5 | (8) | 3 | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | 5 | 4 | | T | 4 | 8 | 6 | 4 | 210-240 | 1,2-2,4 | BPS | VRMp | 0,05 | |
| LG | LG ASTERION | ES-20 | nb | (4) | (4) | 7,5 | | 3 | 5,5 | | (2) | 4 | 4 | 6,5 | 7 | | 5,5 | | R | T | (6) | 6 | 4 | 2 | 150-215 | 0,3-0,7 | BPS | | 0,06 |
| LG | LG AUDACE | 2021 | nb | 2 | 2 | 5,5 | 6,5 | 4 | 5,5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4,5 | 5 | R | | T | 7 | 5 | 7 | 5 | 185-220 | 1,0-2,7 | BPS | VRMp | 0,05 |
| LG | LG AVALON | 2026 | nb | 2 | | 6 | 7 | 3,5 | 7 | | 3 | (6) | 7 | 7,5 | 6 | 4 | | | | T | | 6 | (5) | (3) | 170-215 | 0,6-1,1 | BPS | VOp | 0,1 |

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | | | | | Qualité technologique | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----|-------------|-----|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Aristation (b=barbu / nb=non barbu) | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Pléтин verse ⁽³⁾ | Oïdium* | Rouille jaune* | Septoriose tritici | Rouille brune* | Fusariose (f.,graminearum) | Accumulation DON | Complexe xMosaïques ⁽³⁾ | Cécidomyies Orange | JNO | Chloroturon | PMG | PS | Protéines (GPD) ⁽¹⁾ | Protéines | W à 11,5% de protéines | P/L à 11,5% de protéines | Classe qualité | ANMF VRM / BPMF ⁽²⁾ | CEPP / dose de 500 000 graines ⁽⁴⁾ |
| RAG | RGT PACTEO | 2022 | b | 3 | 4 | 6,5 | (6) | 3,5 | 5,5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | T | 4 | 7 | 8 | 6 | 120-200 | 0,8-1,8 | BPS | VRMp | 0,05 |
| RAG | RGT PROFUSIO ♡ | 2025 | nb | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6,5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6,5 | 6 | 3,5 | 3 | | | | T | (5) | 7 | 7 | 4 | 175-210 | 0,6-0,9 | BPS | VRMp | 0,05 |
| RAG | RGT PROPULSO ♡ | 2023 | b | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5,5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5,5 | 8 | 5 | | | | T | 7 | 6 | 5 | 3 | 140-185 | 0,6-1,4 | BPS | BPMFp | 0,05 | |
| RAG | RGT SEDUCTO | 2026 | b | 3 | | 6,5 | 5 | 3,5 | (6) | | 3 | 7 | 7,5 | 7 | 4,5 | | | | | S | | 6 | (6) | (3) | 120-170 | 0,5-0,9 | BP | | 0,05 | |
| RAG | RGT SPACIO | 2026 | b | 4 | | 6,5 | 6 | 3,5 | 6,5 | | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | | | | | T | | 7 | (8) | (7) | 210-280 | 0,9-1,2 | BPS | VOp | 0,05 | |
| RAG | RGT SUNDEO | 2025 | b | 3 | 3 | 7 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6,5 | 8 | 5,5 | 4,5 | R | R | T | S | (6) | 5 | 5 | 3 | 155-185 | 0,4-0,8 | BPS | VRMp | 0,06 |
| RAG | RGT VALPARAISO | 2025 | b | 6 | 5 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | 7 | (6) | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4,5 | 4,5 | | | S | (4) | 7 | 8 | 5 | 205-255 | 1,4-1,9 | BPS | VRMc | 0,1 | |
| SEC | SHREK | 2022 | nb | 2 | 2 | 6 | (6,5) | 3,5 | 6,5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4,5 | | | | T | 3 | 7 | 6 | 3 | 180-215 | 1,2-2,0 | BPS | VRMp | 0,05 |
| SEC | SPIROU | 2024 | nb | 4 | (3) | 6,5 | 6,5 | 3 | 5,5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7,5 | 6 | 4,5 | 4 | R | | | T | 3 | 6 | 5 | 3 | 170-240 | 0,8-1,8 | BPS | BPMFp | 0,05 |
| SU | SU ADDICTION | 2022 | nb | 3 | 3 | 6 | (7,5) | 3,5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4,5 | 4 | | R | | T | 7 | 7 | 8 | 6 | 180-260 | 0,8-1,2 | BPS | VRMp | 0,06 |
| SU | SU ELECTRON | 2025 | b | 3 | (4) | 7 | 6 | 3 | 6 | (6) | 6 | (7) | 7 | 6,5 | 7 | 4,5 | 4,5 | R | | | T | (6) | 5 | 7 | 4 | 130-185 | 0,5-1,0 | BPS | | 0,05 |
| SU | SU HORIZON ♡ | 2024 | nb | 2 | (2) | 6 | 5,5 | 4 | 6,5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6,5 | 7 | 5 | 4,5 | | | | T | (6) | 5 | 5 | 2 | 135-170 | 0,3-0,9 | BPS | BPMFp | 0,05 |
| SU | SU HYANKEE (h) | 2025 | nb | 3 | 4 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | (4) | 5 | 7 | 6 | 6,5 | 5 | 4,5 | 5,5 | | | S | (9) | 6 | 8 | 5 | 175-210 | 0,6-1,0 | BPS | BPMFp ^{EXT} | 0,07 | |
| SU | SU HYBISCUS (h) | 2024 | nb | 3 | (3) | 7 | 7 | 4,5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7,5 | 7 | 5 | 4,5 | | | | T | 8 | 7 | 8 | 4 | 165-230 | 0,6-1,2 | BPS | VRMp | 0,07 |
| SU | SU HYCARDI (h) | 2022 | b | 3 | 3 | 7,5 | (6,5) | 4 | 5,5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 5 | 5 | R | | | T | 6 | 7 | 7 | 4 | 150-200 | 0,8-1,7 | BPS | VRMp | 0,07 |
| SU | SU HYCLASS (h) | 2025 | nb | 4 | (3) | 6 | 7,5 | 5 | 6,5 | (4) | 2 | 8 | 6 | 6,5 | 4 | 5 | 6 | | | | T | (7) | 8 | 7 | 3 | 160-190 | 0,3-0,7 | BPS | BPMFp | 0 |
| SU | SU HYLORD (h) | 2024 | nb | 3 | (3) | 7 | 8 | 4,5 | 3,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | R | | | T | 8 | 7 | 6 | 1 | 165-205 | 0,5-1,1 | BPS | VRMp | 0 |
| SU | SU HYREAL (h) | 2022 | nb | 2 | 3 | 6,5 | (7) | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5,5 | 5 | R | R | | T | 6 | 7 | 6 | 1 | 145-235 | 0,6-1,6 | BPS | BPMFp | 0,01 |
| SU | SU HYSTORIC (h) | 2025 | nb | 3 | 3 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | 5,5 | 6 | | | S | (7) | 7 | 7 | 2 | 185-215 | 0,5-0,9 | BPS | BPMFp | 0,07 | |
| SU | SU MASTER ♡ | 2025 | b | 3 | (4) | 6,5 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4 | | | | T | (8) | 6 | 7 | 4 | 145-200 | 0,5-1,4 | BPS | VRMp | 0,05 |
| SU | SU PULSION | 2024 | b | 3 | 3 | 7 | 5 | 3,5 | 5,5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4,5 | 4,5 | R | | | T | 4 | 7 | 7 | 3 | 145-205 | 0,5-1,5 | BPS | BPMFp | 0 |

Blé tendre d'hiver et de printemps

28

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | | | | | Qualité technologique | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----|-------------|-----|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Aristation (b=barbu / nb=non barbu) | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Piétin verse ⁽³⁾ | Oïdium* | Rouille jaune* | Septoriose tritici | Rouille brune* | Fusariose (f., graminearum) | Accumulation DON | Complexe xMosaïques ⁽³⁾ | Cécidomyies Orange | JNO | Chloroturon | PMG | PS | Protéines (GPD) ⁽¹⁾ | Protéines | W à 11,5% de protéines | P/L à 11,5% de protéines | Classe qualité | ANMF VRM / BPMF ⁽²⁾ |
| SU | SU SAUVIGNON ♡ | 2024 | b | 3 | 2 | 7 | 5,5 | 3,5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 5 | 4 | 4 | R | | T | 4 | 7 | 6 | 4 | 140-205 | 0,6-1,4 | BPS | VRMp | 0,05 |
| SU | SU SNIPPER ♡ | 2026 | nb | 3 | | 6,5 | 7 | 4 | 5,5 | | 6 | 7 | 7 | 5 | 4,5 | | R | | T | 7 | 7 | (8) | (7) | 170-225 | 0,7-1,1 | BPS | VOp | 0,05 | |
| SU | SU TUCSON | 2026 | b | 5 | | 7 | 6 | 3 | 6,5 | | 3 | 5 | 6,5 | 4 | 4,5 | | R | R | T | | 8 | (8) | (5) | 200-245 | 0,8-1,2 | BPS | VOp | 0,01 | |
| SYN | SY ADMIRATION | 2021 | nb | 4 | 4 | 6,5 | 6,5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6,5 | 5,5 | R | R | S | 6 | 6 | 5 | 3 | 185-235 | 0,5-1,5 | BPS | VRMp | 0,06 |
| SYN | SY SPHYNX (h) | 2026 | nb | 6 | | 6,5 | 7 | 4,5 | 6,5 | | 6 | 7 | 7 | 5 | 5,5 | | R | | T | | 7 | (7) | (8) | 185-235 | 0,8-1,3 | BPS | | 0,07 | |
| SYN | SY TRANSITION | 2023 | b | 2 | 3 | 6 | 7 | 3,5 | 6,5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6,5 | 6 | 6 | | | T | 5 | 7 | 7 | 6 | 230-285 | 0,7-1,8 | BPS | VRMc | 0,05 | |
| SYN | SY XANTHIS (h) | 2026 | nb | 5 | | 7 | 6,5 | 4 | 6,5 | | 6 | 6 | 6,5 | 4 | 5,5 | | | R** | T | | 6 | (8) | (6) | 140-210 | 0,6-1,2 | BPS | | 0,01 | |
| UNI | THERMIDOR ♡ | 2024 | nb | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 4 | 5 | 5,5 | R | R | T | 4 | 6 | 8 | 4 | 180-235 | 0,8-1,7 | BP | VRMp | 0,01 |
| LD | HASHTAG | 2025 | nb | 9 | | 6,5 | | 5 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 190-235 | 0,9-1,4 | BP | | 0 |
| SEC | MOWGLI ♡ | 2024 | nb | 9 | | 6,5 | | 5 | | 4 | | | | (4) | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

Variétés inscrites en 2026

(h) : hybride

* Attention aux risques de contournements

Les blés de printemps sont mentionnés en fin de liste.

(1) : Protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.

(2) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique

(3) : Information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture

** Hybride résistant. La lignée parentale mâle restauratrice étant sensible, le lot de l'hybride peut contenir une proportion variable de plantes sensibles selon le mode de production.

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

Codes obtenteurs / représentants et légende du tableau : en rabat de couverture

GAMME SEMENCES DE FRANCE

| | | | Ari. | Alt. | Mon. | Epi. | Fc. | H. | V. | Ger. | Pi. | Oid. | R. J. | Sep. | R. B. | Fus. | DON | M | Céc. | JNO | Ch. | PMG | PS | GPD | Pr | W | P/L | Cl. | ANMF | CEPP |
|-----|------------|-------|------|------|------|------|-----|----|----|------|-----|------|-------|------|-------|------|-----|---|------|-----|-----|-----|----|-----|----|---|-----|-----|------|------|
| SDF | TURETTAS ♡ | CH-25 | nb | 9 | | 6,5 | | 5 | 6 | | | 7 | | 6,5 | | | | | S | S | | | | 7 | 5 | | | | | |
| SDF | MOHICAN ♡ | | nb | 9 | | 6,5 | | 6 | 6 | | | | 7 | 6 | | | | | | | | | 6 | 5 | | | | | | |

Source des données : Semences de France


Blé tendre d'hiver – Blé Améliorant ou de Force (BAF)

29

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | | | | | Qualité technologique | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----|----|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| | | | Aristation (0=barbu / nb=non barbu) | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Piétin verse ^(a) | Oïdium* | Rouille jaune* | Septoriose tritici | Rouille brune* | Fusariose (f.,graminearum) | Accumulation DON | Complexe Mosaïques ^(a) | Cécidomyies Orange | Chloroburton | PMG | PS | Protéines - GPD ⁽¹⁾ | Protéines - BAF ⁽²⁾ | W à 14% de protéines | P/L à 14% de protéines | Classe qualité | ANMF VRM / BPMF ⁽³⁾ | CEPP / dose de 500 000 graines ⁽⁴⁾ |
| FD | ACTIVITY | 2025 | b | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7,5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5,5 | 5,5 | | R | T | 2 | 9 | 7 | 6 | 315-405 | 0,7-1,2 | BAF | VRMf | 0,11 |
| LD | CELEBI | 2026 | b | 3 | | 7 | 5,5 | 3 | (6) | | 3 | | 7 | 6,5 | 5 | 5,5 | | | | S | | 7 | (8) | (7) | 295-375 | 0,6-1,4 | BAF | VOf | 0,05 |
| ROL | CHEILLON | 2024 | nb | 2 | 3 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | | | T | 9 | 7 | 9 | 8 | 300-395 | 0,6-1,6 | BAF | VRMf | 0,05 |
| ROL | FEDERIS | CH-22 | b | (2) | 2 | 6 | | 4,5 | 6,5 | | (6) | | (8) | (6) | (7) | | | | | (4) | 9 | 8 | 8 | 385-460 | 1,2-2,7 | BAF | VRMf | 0,00 | |
| KWM | FORCALI | 2015 | b | 3 | 4 | 7,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4,5 | | | T | 5 | 8 | 8 | 8 | 240-340 | 0,5-1,0 | BAF | VRMf ⁽⁵⁾ | 0,05 |
| SYN | GIAMBOLOGNA | IT-16 | nb | 4 | 5 | 7,5 | | 3,5 | 7 | | | 4 | 9 | 6 | 4 | | | | | T | 3 | 9 | 7 | 7 | 330-460 | 1,7-2,7 | BAF | VRMf | 0,05 |
| CSP | IZALCO CS | 2016 | b | 3 | 5 | 7,5 | (4) | 4,5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7,5 | 5 | 5,5 | 6 | | S | S | 5 | 9 | 9 | 8 | 335-430 | 0,7-1,5 | BAF | VRMf | 0,00 |
| KWM | KWS CONSTELLUM | 2023 | b | 2 | 4 | 7 | 5,5 | 3,5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5,5 | | | T | 2 | 8 | 9 | 8 | 340-450 | 0,6-1,3 | BAF | VRMf | 0,10 |
| KWM | KWS FORTICIUM | 2022 | b | 5 | 2 | 6 | (6) | 5 | 5,5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 5 | 5 | (4,5) | R | | T | 7 | 6 | 8 | 7 | 240-315 | 0,4-1,4 | | VRMf ⁽⁵⁾ | 0,05 |
| LG | LG AGRIATE | 2024 | b | 5 | 4 | 6,5 | 5,5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5,5 | 4 | 6,5 | 6,5 | | | T | 4 | 9 | 9 | 7 | 350-445 | 1,1-2,1 | BAF | VRMf | 0,00 |
| LG | LG ANOUK | 2025 | b | 6 | 5 | 7,5 | 5 | 3,5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | | | T | 5 | 8 | 9 | 8 | 345-445 | 0,6-1,1 | BAF | VRMf | 0,00 |
| CSP | LID CORDEL | 2026 | b | 3 | | 6 | 7 | 3 | 7 | | 6 | (6) | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | | | | T | | 7 | (7) | (6) | 345-465 | 0,7-1,6 | BAF | VOf | 0,10 |
| CSP | LID FORLANE | 2024 | b | 3 | 4 | 7 | 7,5 | 3,5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | | | S | 4 | 8 | 9 | 9 | 275-355 | 0,6-1,2 | BAF | VRMf ⁽⁵⁾ | 0,05 |
| CSP | LID GATINEL | 2023 | b | 2 | 3 | 6,5 | 6 | 3 | 6,5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6,5 | 5 | 4,5 | (4,5) | | | S | 4 | 8 | 7 | 7 | 305-405 | 0,5-1,5 | BAF | VRMf | 0,05 |
| CSP | LID SALTAREL  | 2026 | b | 3 | | 7,5 | 5 | 4 | (6) | | 3 | | 7 | 6 | 5 | 6,5 | | | | S | | 9 | (9) | (9) | 365-495 | 0,7-1,3 | BAF | VOf | 0,00 |

Blé tendre d'hiver et de printemps – Blé Améliorant ou de Force (BAF)

30

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | | Qualité technologique | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|------------------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----|----|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | Aristation (b=barbu / nb=non barbu) | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Piétin verse (3) | Oïdium* | Rouille jaune* | Septoriose tritici | Rouille brune* | Fusariose (f.,graminearum) | Accumulation DON | Complexe Mosaïques (5) | Cécidomyies Orange | Chloroboluron | PMG | PS | Protéines - GPD (1) | Protéines - BAF (2) | W à 14% de protéines | P/L à 14% de protéines | Classe qualité | ANMF VRM / BPMF (5) |
| AO | REBELDE | 2015 | b | 3 | 4 | 7,5 | 5,5 | 3 | 7,5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5,5 | | | T | 2 | 9 | 8 | 8 | 310-430 | 0,6-1,6 | BAF | VRMf | 0,05 |
| SU | SU CORRECTION | 2024 | nb | 5 | 2 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | R | T | 6 | 6 | 8 | 6 | 295-355 | 0,4-1,0 | BPS | VRMf ⁵ | 0,05 |
| AO | TEOREMA | IT-16 | b | (8) | 5 | 7,5 | | 2,5 | 7 | | | (8) | 4 | 6,5 | 7 | | | | | 6 | 8 | 8 | 8 | 260-340 | 0,7-1,3 | BAF | VRMf ⁵ | 0,05 |
| ROL | BEAUREGARD | 2025 | nb | 9 | | 6,5 | | 5,5 | | 4 | | | | | 8 | | | | | | | | | 275-325 | 0,6-0,9 | BAF | VRMf | 0 |

Variétés inscrites en 2026

(h) : hybride

* Attention aux risques de contournements

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

Codes obtenteurs / représentants et légende du tableau : en rabat de couverture

(1) : Protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.

(2) : Échelle adaptée aux blés améliorants ou de force.

(3) : Information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture.

(5) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique.

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Aristation (b=barbu / nb=non barbu) | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | Pouvoir couvrant | | | Résistances aux maladies | | | | | | | Qualité technologique | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|--|---------------------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Alternativité | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Stade fin tallage | Stade 1-2 nœuds | Stade épisaison | Piétin verse ⁽³⁾ | Rouille jaune* | Septoriose tritici | Rouille brune* | Fusariose (F. graminearum) | Accumulation DON | Carie ⁽⁴⁾ | Complexe Mosaïques ⁽⁵⁾ | Cécidiomyces Orange | PS | Protéines ^{-AB (2)} | ANMF VRM / BPMF ⁽¹⁾ |
| SEC | ABRACADABRA ^{AB} | 2024 | b | 9 | 8 | 1,5 | 6,5 | 5 | 5 | 3,5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5,5 | 6 | S | | | 7 | 5 | VRMp |
| FD | ACTIVITY | 2025 | b | 5 | 7 | 5 | 2 | 7,5 | 5 | (2) | (2,5) | (3) | 3 | 7 | 6 | 7 | 5,5 | 5,5 | | | R | 9 | (7) | |
| SAB | ADAMUS | AT-18 | b | (4) | 6 | | 5,5 | (4,5) | | 3,5 | 4,5 | 6 | | 7 | 7 | 8 | | | | | | 9 | 8 | |
| LD | ALESSIO | AT-16 | b | (2) | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 3 | 3,5 | 5 | | 8 | (6) | 7 | | | | | | 9 | 7 | VRMp |
| SF | APEXUS | RO-19 | b | (4) | 7,5 | | 4,5 | (5,5) | | 3 | 6 | 6,5 | | 6 | 6,5 | 7 | | | | | | 8 | 5 | VRMp |
| LD | ARAMEUS | AT-21 | b | (4) | 5,5 | | 5 | (6) | | 3,5 | 4 | 5,5 | | 5 | 5,5 | 6 | | | | | | 9 | 6 | VRMp |
| LD | ARTIMUS | AT-20 | b | 4 | 7,5 | | 4,5 | 6,5 | | 2,5 | 3,5 | 5 | | 5 | 4 | 7 | | | | | | 9 | 5 | |
| SAB | ASSANTUS | AT-24 | b | | (6) | | (6,5) | | | (4,5) | (5) | (7,5) | | (5) | (5,5) | (8) | | | | | | (9) | (6) | |
| ROL | BODELI | CH-21 | b | (2) | 5,5 | | 5 | | | 3 | 4 | (6) | | (7) | 6,5 | (6) | | | | | | 8 | 8 | |
| SF | CAMILLUS | HU-22 | b | (4) | 6,5 | | 3,5 | | | 2 | 3,5 | 6 | | (6) | | 6 | | | | | | 8 | 7 | BPMFp |
| SF | CAMINADA | CH-22 | b | (4) | 6 | | 5,5 | (4) | | 2 | 3,5 | 5,5 | | 6 | 8 | 7 | | | R | | | 8 | 7 | |
| LD | CHRISTOPH | AT-18 | b | (4) | 6 | | 4,5 | 6 | | 2,5 | 3,5 | 5,5 | | 7 | (5) | 7 | | | | | R | 9 | 6 | VRMp |
| BSP | CIAN | CH-22 | nb | | (5,5) | | (5,5) | | | (3,5) | 4 | (5,5) | | (4) | 7 | (5) | | | | | | (9) | 8 | VoP |
| CSP | ENERGO | AT-09 | b | (3) | 6,5 | | 6,5 | (6) | | 2 | 4,5 | 6,5 | | 5 | 5,5 | 5 | | | | | | 9 | 6 | BPMFp |
| AO | GEEK ^{AB} | 2026 | b | 3 | 5,5 | 7 | 4 | (6,5) | | 3,5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4,5 | | S | | | (7) | (5) | |
| AO | GENY ^{AB} | 2019 | b | 3 | 7 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 4 | 4 | 4,5 | 6 | 4 | 7 | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 | | R | | 6 | 4 | VRMp |
| AUT | GRAZIARO | DE-16 | nb | | 5,5 | | 8 | | | 4,5 | 5,5 | 7,5 | | 7 | | (6) | | | | | | 7 | 6 | |
| AO | GWENN ^{AB} | 2020 | nb | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 7 | 4 | 4 | 5,5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4,5 | 5 | | | | 6 | 3 | |
| AO | GYROS ^{AB} | 2026 | nb | 3 | 6,5 | 5,5 | 4 | (6) | | 3 | 4 | 6,5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | | S | | | (5) | (5) | |
| LD | HASHTAG | 2025 | nb | 9 | 6,5 | | 5 | | 4 | (4) | (7) | | | 7 | | 7 | | | | | | (5) | (3) | |
| CSP | IZALCO CS | 2016 | b | 3 | 7,5 | (4) | 4,5 | 6 | 2 | 2 | 3,5 | 5 | 3 | 8 | 7,5 | 5 | 5,5 | 6 | | | S | 9 | 8 | VRMp |

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Aristation (b=barbu / nb=non barbu) | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | Pouvoir couvrant | | | Résistances aux maladies | | | | | | | Qualité technologique | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|---------------------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----|-------------------|
| | | | | Alternativité | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Stade fin tallage | Stade 1-2 nœuds | Stade épisaison | Piétin verse (3) | Rouille jaune* | Septoriose tritici | Rouille brune* | Fusariose (F. graminearum) | Accumulation DON | Carie (4) | Complexe Mosaïques (5) | Cécidiomyces Orange | PS | Protéines -AB (2) |
| KWM | KWS CONSTELLUM | 2023 | b | 2 | 7 | 5,5 | 3,5 | 7 | 6 | 3 | 4,5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5,5 | | | 8 | 7 | VOp |
| KWM | KWS SHARKI | DE-16 | nb | 9 | 6 | | 6 | | | 3,5 | 5 | 7 | | 5 | (5) | 6 | | | | 8 | 5 | | |
| LD | LD GUSTE ^{AB} | 2025 | nb | 3 | 7 | 6 | 4 | 5,5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5,5 | 4 | 6 | | R | | 5 | 2 | VRMb |
| SU | LENNOX | 2012 | nb | 9 | 6 | | 5 | | | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | (5) | 8 | | | S | S | 7 | 5 | VRMp |
| SF | MONTALBANO ♡ | CH-16 | b | | 5,5 | | 4,5 | (7,5) | | 2,5 | 3,5 | 5,5 | | 6 | 6,5 | 8 | | | | | 8 | 7 | VRMp |
| SF | MOSSETTE ♡ | CH-20 | nb | (9) | 6 | | 5,5 | 4 | | 2,5 | 3,5 | 5,5 | | 7 | 7 | 7 | | | S | | 9 | 8 | |
| AUT | NUMERIC | IT-10 | b | | 7 | | 3,5 | | | 2 | 3 | 4,5 | | 8 | | 7 | | | | | 6 | 4 | |
| UNI | PHILDOR ^{AB} ♡ | 2024 | b | 4 | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 4 | 2 | 3,5 | 5 | 5 | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | S | | 8 | 7 | VRMp |
| AO | RENAN | 1990 | b | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | | 6 | 6,5 | 6 | S | S | 7 | 6 | VRMp |
| RAG | RGT CAPEXO ^{AB} | 2024 | b | 3 | 7 | 5,5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5,5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5,5 | S | R | 6 | 4 | BPMFp |
| BSA | SELVI | CH-24 | b | | (5) | | (6) | | | (2,5) | (3,5) | (7) | | (7) | | (8) | | | | | (9) | (9) | |
| SF | SPINAS ♡ | CH-23 | b | | (6,5) | | (6,5) | | | (3) | (4,5) | (7) | | | (6,5) | (7) | | | | | (9) | (6) | |
| SU | SU TARRAFAL | DE-19 | nb | 9 | 6 | | 5,5 | (5) | | 2,5 | 4,5 | 6 | 4 | 6,5 | 8 | | | | | | 7 | 5 | VRMp |
| AUT | TENGRI | CH-07 | nb | | 5,5 | | 7 | | | 2 | 4 | 7,5 | | 8 | (5) | | | | | | 9 | 8 | VRMp |
| ROL | TOGANO | CH-09 | b | 9 | 6 | | 4,5 | 6,5 | | 2,5 | 4 | 6 | | 5 | 6,5 | 5 | | 4 | | | 7 | 8 | VRMp |
| LD | VALIDUS ^{AB} | 2026 | b | 3 | 6 | 8 | 6,5 | (6) | | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 3 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | | S | | (9) | (7) | |

Variétés inscrites en 2026 en AB * Attention aux risques de contournements

^{AB} : Variété inscrite au catalogue français après évaluation dans les conditions de l'agriculture biologique

Source des données : ARVALIS, Expébio et CTPS/GEVES

Codes obtenteurs / représentants et légende du tableau : en rabat de couverture

(1) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française pour les Blés Biologiques

























(2) : notes de 1 à 9 calculées à partir des teneurs en protéines des variétés obtenues lors de leur évaluation en agriculture biologique. Cette échelle est différente de celle utilisée dans les réseaux conventionnels.

(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

(4) : information acquise lors de l'inscription au catalogue français après évaluation dans les conditions de l'agriculture biologique

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

CLASSEMENT 2025 DES VARIÉTÉS SELON LEUR BESOIN EN AZOTE - COEFFICIENTS b ET $bq_{11,5\%}$

| Classes de b | Variétés | Classes de $bq_{11,5\%}$ | Modalités de fractionnement à respecter en utilisant $bq_{11,5\%}$ | |
|--------------|---|--------------------------|--|--|
| | | | $bc_{11,5\%}$ | Mise en réserve minimale conseillée pour la fin de montaison |
| 2,8 | LG NIKLAS | 2,8 | 0 | 40* kg N |
| | ADVISOR, AMPLEUR, ARCACHON, BELZEBUTH , CAMPESINO, CELEBRITY, CHEVIGNON  , FACILITY  , GODZILLA, HYBIZA, HYLIGO, HIMALAYA, HYSTAR, KARABOL, KINGKONG  , KWS AGRUM, KWS ETOILE  , KWS GLOBE  , LG AERO, LG AKATHON, LG ASTERION, OLAF, RGT FARMEO, RGT INDEXO, RGT MAJESKO , RGT PROPULSO  , SHREK, SU HORIZON  , SU HYLORD, SU HYREAL, SU HYSTORIC , SY ADMIRATION, SY ROCINANTE | 3 | 0,2 | 60 kg N (40*+20) |
| 3 | ACADEMY, AGENOR, APACHE, ARKEOS, AUCHY , BALZAC, CHAMDOR , CONQUISTADOR  , GEOPOLIS , GERRY, HANSEL, INTENSITY  , JERIKO  , JUNIOR  , KAKTUS  , KAROQUE, KWS ERRUPTIUM, KWS PARFUM, KWS SPHERE, LG ABRAZO, LG ABSALON, LG ACADIE, LG ACROBAT , LG ARLEY, LG AUDACE, OBIWAN, OREGRAIN, OUTDOOR  , PAILLEDOR  , PIBRAC, PRESTANCE, PROVIDENCE, RGT LUXEO, RGT NOBELLO, RGT PROFUSIO  , RGT VALPARAISO , STROMBOLI, SU ECUSSON, SU ELECTRON , SU HYANKEE , SU HYBISCUS, SU HYCARDI, SU HYTONI, SU MASTER  , SU MOUSQUETON, SU SAUVIGNON  , SY PASSION, TALENDOR, THERMIDOR  , WINNER | 3 | 0 | 40* kg N |
| | ACCOMPLY , COMPLICE, GARFIELD, GENERIK , GRAVELINE, HYACINTH, KWS ASTRUM, KWS EXTASE, KWS MILLESIME  , KWS PERCEPTIUM  , KWS REGATE, KWS ULTIM, LID PAVANE , MACARON, PONDOR  , RGT KOESIO , RGT LOOKEO  , RGT PALMEO, RGT SACRAMENTO, RGT SUNDEO, RGT TWEETEO, SPIROU, SU HYCLASS , SU PULSION | 3,2 | 0,2 | 60 kg N (40*+20) |
| 3,2 | FABULOR  , GREKAU, LG ABILENE, LG AIKIDO, LID MACUMBA, RGT BORSALINO, RGT LETSGO, RGT MONTECARLO  , RGT PACTEO, SU ADDICTION, SY TRANSITION, UNIK | 3,2 | 0 | 40* kg N |

*: la mise en réserve minimale de 40 kg N pourra être réduite en cas de faible potentiel

Les variétés introduites pour 2025 dans le classement sont **en gras** et celles modifiées depuis l'an dernier sont **en couleur**

Pour un usage en blé biscuitier, il faut tenir compte que des besoins unitaires, sans le complément qualité.

Source : ARVALIS

2 PRÉCOCITÉ DES VARIÉTÉS

RYTHME DE DÉVELOPPEMENT DES VARIÉTÉS : PRÉCOCITÉS À MONTAISON ET ÉPIAISON

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|
| PRÉCOCITÉ À ÉPIAISON | Ultra Précoce 8 | | | | RGT MONTECARLO ♡ | AGEN | | |
| | Très Précoce 7,5 | | | PIBRAC SU HYCARDI | ARTIMUS FORCALI (LG ASTERION) | REBELDE RGT LETSGO SU HYANKEE | GIAMBOLOGNA GREKAU IZALCO CS LG ANOUK RGT VALPARAISO TEOREMA | PRESTANCE |
| | Précoce 7 | | ACADEMY ARKEOS SU SAUVIGNON ♡ | APACHE CHAMDOR CONQUISTADOR <i>FUNNY</i> ♡ KAKTUS ♡ KAROQUE LG ABILENE | RGT PROPULSO ♡ RGT SUNDEO (SU HYBISCUS) (SU HYLORD) SU PULSION | ACTIVITY BALZAC CELEBRITY FACILITY ♡ <i>GRIFONDOR</i> ♡ HYLIGO KWS CONSTELLUM | KWS PARFUM LG AIKIDO LID FORLANE (LID MACUMBA) (SU ELECTRON) THERMIDOR ♡ | ARCACHON KWS MILLESIME ♡ |
| | ½ Précoce 6,5 | | KWS SPHERE OUTDOOR ♡ RGT LOOKEO ♡ | (BELZEBUTH) CHEILLON (RGT FARMEO) INTENSITY ♡ KWS PERCEPTUM ♡ (SPIROU) LG ABSALON LG ACROBAT LG ARLETY LID GATINEL | RGT LUXEO SU HYREAL SU HYSTORIC <i>SU SNIPPER</i> ♡ | <i>BATMAN</i> ♡ JERIKO ♡ LG AGRIATE RGT PACTEO (SU MASTER) ♡ SY ADMIRATION | HANSEL | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <p>½ Précoce à ½ Tardif</p> <p>6</p> | | <p>ACCOMPLY</p> <p>CHEVIGNON ♥</p> <p>(FABULOR) ♥</p> <p>FEDERIS</p> <p>KINGKONG ♥</p> <p>KWS EXTASE</p> | <p>KWS FORTICIUM (LID PAVANE)</p> <p>RGT MAJESKO</p> <p>RGT PROFUSIO ♥</p> <p>SHREK</p> <p>(SU HORIZON) ♥</p> | <p>EVERY ♥</p> <p>GENERIK</p> <p>JUNIOR ♥</p> <p>KWS ASTRUM</p> <p>PONDOR ♥</p> | <p><i>RGT ARPEGIO</i> ♥</p> <p>(RGT KOESIO)</p> <p>SU ADDICTION</p> <p>(SU HYCLASS)</p> <p>SY TRANSITION</p> | | | |
| | <p>½ Tardif</p> <p>5,5</p> | <p>(KWS ETOILE) ♥</p> | <p>KWS ERRUPTIUM</p> <p>KWS GLOBE ♥</p> <p>LG AUDACE</p> | <p>(OLAF)</p> <p>(RGT INDEXO)</p> <p>SU CORRECTION</p> | <p><i>DUMBLEDDOR</i> ♥</p> <p>GEOPOLIS</p> <p>(LG NIKLAS)</p> | | <p>(EKONOM)</p> | |
| | <p>Tardif</p> <p>5</p> | | <p>(LG AERO)</p> | | | | | |
| | <p>Très Tardif</p> <p>4,5</p> | | | | | | | |
| | <p>Groupe</p> | <p>Tardif</p> <p>1</p> | <p>½ Tardif</p> <p>2</p> | <p>½ Précoce</p> <p>3</p> | <p>Précoce</p> <p>4</p> | <p>Très Précoce</p> <p>5</p> | <p>Ultra Précoce</p> <p>6</p> | |

PRÉCOCITÉ À MONTAISON

Les variétés précoces à montaison doivent être semées tard

| REGION | Début optimum des semis | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| CENTRE - IDF | 1/10 | 1/10 | 5/10 | 10/10 | 15/10 | 25/10 | 5/11 | |
| CHAMPAGNE - EST | 25/9 | 25/9 | 1/10 | 5/10 | 10/10 | 15/10 | | |
| PICARDIE | 25/9 | 1/10 | 10/10 | 10/10 | 20/10 | 1/11 | 1/11 | |
| BRETAGNE | | 10/10 | 10/10 | 20/10 | 25/10 | 30/10 | | |
| SUD-OUEST | | | | 20/10 | 25/10 | 5/11 | 10/11 | |

| Besoin en vernalisation (jours) | | | | | |
|---------------------------------|----|----------------------------|----|----------------------------|----|
| 1 - TRES HIVER | 60 | 4 - ½ HIVER | 40 | 7 - ALTERNATIF | 15 |
| 2 - HIVER | 50 | 5 - ½ HIVER à ½ ALTERNATIF | 32 | 8 - ALTERNATIF à PRINTEMPS | 10 |
| 3 - HIVER à ½ HIVER | 45 | 6 - ½ ALTERNATIF | 25 | | |

En gras : témoins

Entre () : positionnement à confirmer par des observations complémentaires

En italique : source Semences de France

Source des données d'essais ARVALIS / GEVES

Orge d'hiver 2 rangs

36

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | | | Qualité technologique | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-----|----|-----------|-----------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épilaison | Froid | Hauteur | Verse | Oïdium* | Rhynchosporiose | Helminthosporiose | Rouille naine* | Ramulariose | Nuisibilité globale maladies (1) | Mosaïque BaMV2 | Jaunisse Nantisante | Maladie des pieds chétifs | PMG | PS | Calibrage | Protéines | Avis Matière (CBMO) | CEPP / dose de 500 000 graines (2) |
| SEC | ATOMIC ♥ | 2026 | 4 | | 6 | 6,5 | 5 | 6,5 | 5 | | 7 | 6 | (6) | 6 | | | | | | | | | 0,184 |
| AO | BONNOVI | DE-24 | 4 | 3 | 6,5 | (5) | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | (5) | 5 | R | T | | 7 | 6 | | | | 0,110 |
| LG | CALYPSO | 2013 | 6 | (2) | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 7 | | 5 | | | | 8 | 6 | 8 | 4,5 | | 0,088 |
| SEC | COMTESSE | 2022 | (5) | 4 | 7 | (4,5) | 4,5 | 5,5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | | | | 7 | 7 | 8,5 | 4 | Préf* | 0,112 |
| SEC | DUCHESSE | 2025 | 7 | | 7,5 | 5 | 5 | 5,5 | (7) | 5 | 5 | 5 | (6) | 5 | | T | | 9 | 7 | 8,5 | 4,5 | Obs 1 | 0,090 |
| AO | ETERNITY ♥ | 2026 | 5 | | 7 | 6 | 5,5 | 4,5 | 7 | | 7 | 6 | (6) | 6 | | T | | | | | | | 0,164 |
| KWM | KWS LEGENDIS | 2026 | 5 | | 6 | 6,5 | 5 | 5,5 | 7 | | 6 | 7 | (5) | 6 | | T | | | | | | | 0,164 |
| KWM | KWS MATTIS ♥ | 2024 | 5 | 3 | 6 | (5,5) | 5,5 | 6,5 | 6 | 5 | 6 | 5 | (6) | 6 | | T | | 9 | 8 | | | | 0,110 |
| KWM | KWS OVNIS | 2023 | 6 | 3 | 6,5 | (7) | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | (6) | 6 | | T | | 9 | 7 | 8,5 | 4,5 | | 0,202 |
| LG | LG CAPORAL | 2026 | 5 | | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 7 | | 6 | 6 | (6) | 6 | | T | | | | | | | 0,164 |
| LG | LG CARPENTER | 2025 | 5 | (4) | 6 | 5,5 | 5 | 5 | (7) | (7) | 7 | 6 | (6) | 6 | | T | | 7 | 7 | | | | 0,164 |
| LG | LG CASTING | 2017 | 5 | 3 | 6,5 | (5,5) | 5 | 5,5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | 7 | 6 | 7,5 | 4,5 | | 0,000 |
| UNI | MAJORETT ♥ | 2026 | 4 | | 7 | 6,5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 6 | (5) | 7 | R | T | | | | | | | 0,164 |
| UNI | MAJUSCULE ♥ | 2022 | (5) | 4 | 6 | (3) | 5,5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | (6) | 5 | R | T | | 9 | 5 | | 4 | | 0,090 |
| UNI | MANADE ♥ | 2025 | 5 | (2) | 5,5 | 6 | 5 | 3 | (6) | (6) | 7 | 6 | (6) | 6 | R | T | | 8 | 8 | | | | 0,090 |
| SEC | MEMENTO | 2017 | 4 | 2 | 6 | (5) | 5 | 5,5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | | | | 7 | 7 | 8 | 4,5 | | 0,074 |
| SEC | NOBLESSE | 2021 | 4 | | 6,5 | (6) | 4,5 | 6,5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | 7 | 7 | 8 | 4 | | 0,024 |
| RAG | ORGANA | 2024 | 3 | 3 | 6 | (4,5) | 5,5 | 4,5 | 7 | 7 | 6 | 6 | (6) | 7 | | T | | 8 | 6 | | | | 0,164 |
| FD | PAQUITA | 2025 | 6 | (4) | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 6 | (6) | 6 | 5 | (5) | 5 | | T | | 8 | 6 | | | | 0,090 |

Variétés inscrites en 2026

* Attention aux risques de contournements

(1) : Cotation basée sur les pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide. Pour l'orge d'hiver, cette cotation est établie dans un contexte dominé par la rhynchosporiose, l'helminthosporiose et la rouille naine.

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

(2) : sous réserve de publication au Journal Officiel.

Codes obtenteurs / représentants et légende du tableau : en rabat de couverture



| | Alt. | Mon. | Epil. | Fr. | H. | V. | Oid. | Ryn | Hel. | R. N | Ram. | Nuis | M | JNO | P Ch | PMG | PS | Cal | Pr | Avis Mat | CEPP |
|--|-------|------|-------|-----|----|----|------|-----|------|------|------|------|---|-----|------|-----|----|-----|----|----------|------|
|  ALEKSANDRA ♥ | | | 4 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | S | S | S | 7 | 7 | | | 4 | |
| GOLDMARIE ♥ | AL-22 | | 3 | 6,5 | | 5 | 5,5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | S | S | S | 9 | 7 | | | 4 | |

Source des données : Semences de France

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | | | Qualité technologique | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----|----|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Oïdium* | Rhynchosporiose | Helminthosporiose | Rouille naine* | Ramulariose | Nuisibilité globale maladies (1) | Mosaïque BaYMV2 | Jaunisse Nantisante | Maladie des pieds chétrifs | PMG | PS | Calibrage | Protéines | Avis Matière (CBMO) | CEPP / dose de 50 000 graines (2) |
| LD | ALIENOR  | 2024 | 5 | 3 | 6,5 | (4,5) | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | (6) | 6 | | T | | 7 | 5 | | | | 0,164 |
| SEC | CARROUSEL | 2022 | (5) | 5 | 7 | (4,5) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | T | | 5 | 7 | 8 | 4 | Préf | 0,090 |
| SEC | CONSTEL | 2022 | (6) | 5 | 7 | (4) | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | | T | | 5 | 6 | 8 | 4,5 | Préf* | 0,090 |
| SEC | DEMENTIEL | 2020 | 4 | 4 | 6,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 8 | 4 | | 0,000 |
| SEC | DIGITAL | 2025 | 5 | | 6,5 | 5 | 5 | 4,5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | | T | | 4 | 5 | | | | 0,164 |
| SEC | HOPINEL | 2026 | 4 | | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | (6) | 6 | | T | | | 6 | 8,5 | 4 | Val | 0,202 |
| SEC | INTEGRAL | 2022 | (5) | 5 | 7 | (4,5) | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | | T | | 6 | 6 | | 4 | | 0,110 |
| KWM | KWS DIVINATRIS | 2026 | 4 | | 7 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | (5) | 7 | | T | | | 5 | 7,5 | 4 | Val | 0,178 |
| KWM | KWS EXQUIS | 2021 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | | T | | 5 | 5 | 8,5 | 4 | | 0,202 |
| KWM | KWS FARO | 2018 | 5 | 4 | 7 | 7,5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | | | | 4 | 6 | 8 | 4 | Préf | 0,024 |
| KWM | KWS FUTURIS  | 2025 | 5 | (3) | 6,5 | 6 | 5 | 6,5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | | T | T | 5 | 6 | | | | 0,110 |
| KWM | KWS INNOVATRIS | 2024 | 7 | (5) | 7,5 | (6,5) | 4 | 5,5 | 5 | (6) | 6 | 6 | (5) | 6 | | T | T | 5 | 5 | | | | 0,164 |
| KWM | KWS JAGUAR | 2019 | 6 | 5 | 8 | (5) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | | T | | 5 | 6 | 8 | 4 | | 0,090 |
| KWM | KWS JOYAU | 2020 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4,5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | | T | | 6 | 6 | 8 | 4,5 | | 0,114 |
| SEC | LAROCHEL | 2026 | 5 | | 7,5 | 6,5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | (5) | 6 | | T | | | 5 | 8 | 4 | Val | 0,090 |
| LG | LG ZAO | 2025 | 6 | | 8 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 4 | (5) | 6 | 5 | | T | | 5 | 5 | 8,5 | 4 | | 0,090 |
| LG | LG ZEBRA | BE-18 | 6 | 6 | 8 | | | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | | T | | 7 | 6 | | | | 0,110 |
| LG | LG ZEFIRA | 2024 | 8 | 5 | 7,5 | (7,5) | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 7 | (5) | 7 | R | T | | 4 | 5 | | | | 0,164 |
| LG | LG ZENIKA | 2021 | 7 | (5) | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | R | T | | 4 | 5 | | 4,5 | | 0,184 |

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | | Qualité technologique | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|---------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-----|-----|-----------|-----------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épilaison | Froid | Hauteur | Verse | Oïdium* | Rhynchosporiose | Helminthosporiose | Rouille naine* | Ramulariose | Nuisibilité globale maladies (1) | Mosaïque BaMV2 | Jaurisse Nantisante | Maladie des pieds chétifs | PMG | PS | Calibrage | Protéines | Avis Matière (CBMO) | CEPP / dose de 500 000 graines (2) |
| LG | LG ZORBAS | 2024 | 7 | (4) | 7,5 | (7,5) | 4,5 | 5 | 7 | (7) | 7 | 6 | (7) | 6 | | T | | 6 | 6 | | | | 0,164 |
| LG | LG ZORICA | 2023 | 6 | 5 | 8 | (5) | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | T | | 6 | 6 | | 4 | | 0,110 |
| SEC | LITTORAL | 2025 | 5 | | 6 | 6 | 5 | 6,5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | | T | | 5 | 6 | | | | 0,110 |
| UNI | MAELYS | 2026 | 6 | | 7,5 | 6,5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | (5) | 7 | | T | | | 7 | | | | 0,110 |
| LD | OVALIE | 2025 | 5 | (4) | 7 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | | T | | 5 | 6 | | | | 0,090 |
| SYN | SY BANKOOK (h) | HR-21 | 4 | 3 | 6,5 | (6,5) | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 6 | 5 | | | | 0,067 |
| SF | SY COLYSE0 (h) | 2024 | 4 | | 6,5 | (7) | 5,5 | 5,5 | 6 | (6) | 7 | 6 | | 6 | | | | 5 | 6 | | | | 0,053 |
| SYN | SY COOPERNIC (h) | 2026 | 5 | | 6 | 7 | 5,5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | (7) | 6 | | | | | 7 | | | | 0,067 |
| SYN | SY DAKOOTA (h) | DE-20 | | | 6,5 | | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | (5) | 6 | 5 | | | | 6 | 6 | | | | 0,014 |
| SF | SY FASTNET (h) | 2026 | 5 | | 6 | 7 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 5 | 7 | (7) | 6 | | | | | 7 | | | | 0,000 |
| SYN | SY GALILE0 (h) | DE-18 | (4) | 3 | 6,5 | | | 4,5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 6 | 5 | | | | 0,053 |
| SF | SY LOONA (h) | 2022 | (4) | 3 | 6 | (5) | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | 4 | | 0,053 |
| SF | SY PANTHEON (h) | 2026 | 4 | | 6 | 7 | 5,5 | 5,5 | 6 | 8 | 6 | 6 | (7) | 6 | | T | | | 7 | | | | 0,117 |
| SYN | SY SPAR00 (h) | 2025 | 5 | (3) | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | | T | | 6 | 7 | | | | 0,117 |
| SYN | SY ZOOMBA (h) | HR-24 | | (3) | 6,5 | | 5,5 | 5,5 | (7) | (7) | | (6) | (7) | 6 | | T | | 6 | 6 | | | | 0,000 |
| SEC | TITANEL | 2026 | 6 | | 6,5 | 6,5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | (6) | 5 | | T | | 6 | 8,5 | 4 | | | 0,202 |

Variétés inscrites en 2026

(h) : hybride

* Attention aux risques de contournements

(1) : Cotation basée sur les pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide.

Pour l'orge d'hiver, cette cotation est établie dans un contexte dominé par la rhynchosporiose, l'helminthosporiose et la rouille naine.

(2) : sous réserve de publication au Journal Officiel.

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

Codes obtenteurs / représentants et légende du tableau : en rabat de couverture

2 PRÉCOCITÉ DES VARIÉTÉS

RYTHME DE DÉVELOPPEMENT DES VARIÉTÉS : PRÉCOCITÉS À MONTAISON ET ÉPIAISON

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| PRÉCOCITÉ À ÉPIAISON * | Ultra Précoce 8 | | | | | | KWS JAGUAR LG ZORICA | LG ZEBRA |
| | Très Précoce 7,5 | | | | | (LG ZORBAS) | (KWS INNOVATRIS) LG ZEFIRA (LG ZENIKA) | |
| | Précoce 7 | | | <i>Majorett</i> ♥ | | Comtesse <i>Eternity</i> ♥ KWS FARO | KWS JOYAU (OVALIE) | CARROUSEL CONSTEL INTEGRAL |
| | ½ Précoce 6,5 | | | ALIENOR ♥ <i>Atomic</i> ♥ Bonnovi (California) <i>Goldmarie</i> ♥ (KWS FUTURIS) ♥ | KWS Ovnis LG Casting SY BANKOOK SY GALILEO SY SCOOP (SY ZOOMBA) TEKTOO | <i>Aleksandra</i> ♥ DEMENTIEL | | (Amandine) |
| | ½ Tardif à ½ Précoce 6 | | (Calypso) Memento | KWS EXQUIS KWS Mattis ♥ SY LOONA | (SY SPAROO) Organa | (LG Carpenter) Majuscule ♥ (Paquita) | | |
| | ½ Tardif 5,5 | | (Manade) ♥ | | | | | |
| | Tardif 5 | | | | | | | |
| | <i>Groupe</i> | Tardif 1 | ½ Tardif 2 | ½ Précoce 3 | Précoce 4 | Très Précoce 5 | Ultra Précoce 6 | |
| PRÉCOCITÉ À MONTAISON ** | | | | | | | | |

* Source des données d'essais GEVES, ARVALIS.

** Source des données d'essais ARVALIS

Entre () : à confirmer

En MAJUSCULE : les orges 6 rangs ; en minuscule : les orges 2 rangs






En *italique* : source Semences de France

Les variétés précoces à montaison doivent être semées tard

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | Qualité technologique | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------|---------|-------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----|-----------|-----------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| | | | Précocité montaison | Précocité épiaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Feuillage | | | Epis | | | PMG | PS | Protéines | Indice de jaune | Clarté (indice de brun) | Moucheture | Mittadineage | Classe technologique \$ | Avis semoulerie |
| | | | | | | | | | Oïdium* | Rouille jaune* | Rouille brune* | Septorioses (majoritairement S.tritici) | Fusariose épi | Accumulation DON | | | | | | | | | |
| RAG | ANVERGUR  | 2013 | 2 | 6 | 4 | 3,5 | 5 | 2 | 6,5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 6 | 7 | 6 | BDQ | VRSP |
| FD | CABAYOU | 2024 | 2 | 5,5 | | 3 | 7 | 2 | 4,5 | 7 | 8 | 7 | 4,5 | 4 | 7 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6 | BDQ | VRSP |
| SF | CLAUDIO | IT-98 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3,5 | | 5 | 7 | 7 | 4 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 8 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 4 | BDS | VRSP |
| AO | DIMOKRITOS  | GR-16 | 3 | 7 | | | | | | | | 5,5 | | 5 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 5 | BDQ | |
| FD | FUSILOU | 2025 | 2 | 5,5 | | 3,5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 7,5 | 8,5 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 6 | BDQ | VRSP |
| RAG | KALYPSUR | 2026 | | 5,5 | | 3,5 | (5,5) | | | 6 | 9 | 7 | 4,5 | | 6 | | 5,5 | 7,5 | 7 | 8 | 4 | BDS | |
| RAG | RGT BELALUR  | 2021 | 2 | 5,5 | | 3,5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6,5 | 4,5 | 4 | 6,5 | 5 | 5,5 | 8 | 6,5 | 7,5 | 6 | BDQ | VRSP |
| RAG | RGT DEMESUR  | 2026 | | 5,5 | | 3 | 6,5 | | | 7 | 9 | 7 | 4,5 | | 6 | | 5,5 | 8 | 7 | 8 | 5,5 | BDQ | |
| RAG | RGT INSIEMUR | 2024 | 2 | 5,5 | | 3 | 5 | 2 | 6,5 | 8 | 8 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 7 | 6 | 7,5 | 6 | BDQ | VRSP |
| RAG | RGT KAPSUR | 2021 | 2 | 6 | | 3 | 5,5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 8 | 6 | 7,5 | 6 | BDQ | |
| RAG | RGT TOPALLUR | 2026 | | 6 | | 3,5 | 5,5 | | | 7 | 9 | 7 | 4,5 | | 6 | | 5,5 | 7 | 6 | 8 | 4,5 | BDS | |
| RAG | RGT VOILUR  | 2016 | 2 | 6 | | 2,5 | 7 | 2 | 6,5 | 7 | 8 | 6,5 | 4,5 | 3 | 6,5 | 5 | 6 | 7,5 | 6,5 | 8 | 5,5 | BDQ | VRSP |

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | Qualité technologique | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------|---------|-------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----|-----------|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------------------|-----------------|
| | | | Précocité montaison | Précocité épiaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Feuillage | | | Epis | | | PMG | PS | Protéines | Indice de jaune | Clarté (Indice de brun) | Moucheture | Mitadinage | Classe technologique § | Avis semoulerie |
| | | | | | | | | | Oïdium* | Rouille jaune* | Rouille brune* | Septoriose (majoritairement S.tritici) | Fusariose épi | Accumulation DON | | | | | | | | | |
| FD | ROCAILLOU ♡ | 2023 | 2 | 6 | | 3,5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 8,5 | 5,5 | 8 | 6 | BDE | VRSP |
| Blé dur inscrit au catalogue français en conditions de l'agriculture biologique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO | DANUBE | 2024 | (3) | 6,5 | | 4 | 4,5 | 2 | | 8 | 8 | | 4 | | 8 | | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | BDE ^{AB} | |

Variétés inscrites en 2026

* Attention aux risques de contournements

Codes obtenteurs / représentants et légende du tableau : en rabat de couverture

(AB) : Variété évaluée dans les conditions de l'agriculture biologique

() : donnée sur la variété à valider par des observations supplémentaires.

§ : Classes attribuées à l'inscription (CTPS) ou en post-inscription (ARVALIS) uniquement pour les variétés Européennes et AB.

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

GAMME SEMENCES DE FRANCE

| SDF | CATONE ♡ | IT-24 | Mon. | Epia. | Fr. | H. | V. | Ger. | Oïd. | R. J. | R. B. | Sep. | Fus. | DON | PMG | PS | Pr | Jau. | Clar. | Mouch. | Mita. | Classe | Avis |
|-----|----------|-------|------|-------|-----|----|----|------|------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|--------|-------|--------|------|
| | | | 3 | 6 | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 4,5 | | 9 | 5,5 | 6,5 | | | 6,5 | 6 | | |

Source des données : Semences de France

2 PRÉCOCITÉ DES VARIÉTÉS

RYTHME DE DÉVELOPPEMENT DES VARIÉTÉS : PRÉCOCITÉS À MONTAISON ET ÉPIAISON

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|---|--------------|-------------------|--|
| PRÉCOCITÉ À ÉPIAISON * | Ultra Précoce 7,5 | | | | | |
| | Très Précoce 7 | | | DIMOKRITOS ♡ | CLAUDIO | |
| | Précoce 6,5 | | | (DANUBE) | | |
| | ½ Précoce 6 | | ANVERGUR ♡ RGT KAPSUR RGT VOILUR ♡ ROCAILLOU ♡ | CATONE ♡ | | |
| | ½ Tardif 5,5 | | (CABAYOU) (FUSILOU) RGT BELALUR ♡ <i>RGT DEMESUR</i> ♡ (RGT INSIEMUR) | | | |
| | Tardif 5 | | | | | |
| <i>Groupe</i> | Tardif 1 | ½ Tardif 2 | ½ Précoce 3 | Précoce 4 | Très Précoce 5 | |
| PRÉCOCITÉ À MONTAISON ** | | | | | | |

* Source des données d'essais : ARVALIS / GEVES

** Source des données d'essais : ARVALIS

En italique : source Semences de France

Les variétés précoces à montaison doivent être semées tard

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des tournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | | Qualité grains | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|---|------------------|--------------------|-----|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Piétin verse | Oïdium* | Rouille jaune* | Rhynchosporiose | Rouille brune* | Nuisibilité globale maladies ⁽¹⁾ | Accumulation DON | Complexe Mosaïques | PMG | PS | Protéines - GPD ⁽²⁾ | Viscosité potentielle éthanolique |
| SEC | ALLROUNDER PZO | DE-21 | | 1 | 6,5 | | 7,5 | 6,5 | | | 9 | (9) | 6 | | 9 | | | 6 | 8 | 8 | |
| LD | BIATHLON | 2024 | 6 | 4 | 6,5 | 5 | 7,5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6,5 | | 6 | 9 | 5 | 3,5 |
| LD | BICROSS ♡ | 2023 | 6 | 5 | 6,5 | 5,5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6,5 | | 6 | 8 | 7 | 3 |
| LD | BIKINI | 2016 | 8 | 5 | 8 | | 6 | 6,5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | | (4) | T | 6 | 7 | 7 | 2,6 |
| LD | BILBOQUET | 2020 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6,5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | T | 6 | 5 | 4 | 4,1 |
| LD | BONJOUR | 2023 | 8 | 2 | 7 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4,5 | | 5 | 6 | 8 | 2,2 |
| FD | BREHAT | 2018 | 7 | 3 | 6,5 | (7) | 7 | 5,5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3,5 | S | 7 | 5 | 4 | 3,8 |
| SEC | CHARME | DE-21 | | (4) | 6 | | 6 | 7 | | | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | (4) | | 6 | 9 | 7 | |
| LD | CURLING | 2025 | 4 | (3) | 6 | 6 | 7 | 4,5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3,5 | | (8) | 4 | 6 | 2,6 |
| LD | GALAXOR ♡ | 2026 | 4 | | 6,5 | 5,5 | 7 | (5) | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | (6) | | | | 5 | 4 | 5,2 |
| LD | KITESURF | 2020 | 7 | 4 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5,5 | | 8 | 7 | 5 | 2,6 |
| AO | LUMACO ♡ | 2020 | 4 | 2 | 6,5 | 5 | 7 | 5,5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5,5 | S | 5 | 7 | 6 | 2,2 |
| CSP | PADDLE | BE-22 | | (3) | 6,5 | | 7 | 5 | | | 8 | (7) | 7 | | (8) | | | 5 | 6 | 6 | |
| KWM | PROMISO ♡ | PL-24 | | 0 | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | | | 7 | (7) | 7 | (6) | 9 | 5 | | 6 | 6 | 6 | |
| AO | RAFTING ♡ | 2026 | 7 | | 6,5 | 5,5 | 7,5 | (4,5) | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | (9) | | | | 6 | 7 | 5,7 |
| LG | RALLY | 2026 | 6 | | 7 | 5 | 6,5 | (6) | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | (7) | | | | 5 | 5 | 3,5 |
| AO | RAMDAM | 2018 | 6 | 3 | 6,5 | (7) | 7 | 6,5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4,5 | T | 7 | 4 | 4 | 4,2 |
| AO | RAPACE | 2025 | 3 | (3) | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | | (9) | 6 | 6 | 3,5 |
| AO | RENDEZVOUS | 2024 | 5 | (4) | 6,5 | 7 | 7,5 | 2,5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | (5) | | (5) | 4 | 3 | 2,5 |
| LG | REPTIL | 2025 | 5 | (2) | 6,5 | 5 | 7 | 5,5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | | (5) | 4 | 6 | 4,8 |

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | | | | | Résistances aux maladies | | | | | | | Qualité grains | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|---|------------------|--------------------|-----|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Alternativité | Précocité montaison | Précocité épisaison | Froid | Hauteur | Verse | Germination sur pied | Piétin verse | Oïdium* | Rouille jaune* | Rhynchosporiose | Rouille brune* | Nuisibilité globale maladies ⁽¹⁾ | Accumulation DON | Complexe Mosaïques | PMG | PS | Protéines - GPD ⁽²⁾ | Viscosité potentielle éthanolique |
| AO | REQUIEM | 2026 | 6 | | 6,5 | 5,5 | 7,5 | (5) | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | (7) | | | 8 | 6 | 4,2 | |
| AO | REQUIN | 2025 | 5 | (4) | 7,5 | 5,5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4,5 | (9) | 7 | 7 | 2,5 | |
| RAG | RGT KEZAC | 2026 | 7 | | 6 | 5 | 6,5 | (6) | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | (8) | | | 6 | 7 | 3,8 | |
| RAG | RGT OMEAC | 2017 | 5 | 4 | 7 | | 6,5 | 5,5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4,5 | T | 8 | 8 | 7 | 2,1 |
| RAG | RGT QUATERBAC | 2023 | 5 | 4 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5,5 | | 5 | 6 | 5 | 3 |
| RAG | RGT RUSTILAC | 2024 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5,5 | | 8 | 8 | 5 | 4,2 |
| RAG | RGT RUTENAC | 2020 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7,5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | T | 7 | 7 | 6 | 2,4 |
| RAG | RGT ZIGZAC | 2023 | 6 | 1 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4,5 | | 7 | 6 | 4 | 2,9 |
| AO | RORKAL | 2026 | 6 | | 7,5 | 6 | 6 | (5,5) | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | (6) | | | 5 | 7 | 2,2 | |
| AO | RUGIRO | 2025 | 5 | (2) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3,5 | (9) | 8 | 7 | 2,2 | |
| SU | SU PAPYRUS | 2026 | 2 | | 6 | 8 | 7 | (6,5) | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | (9) | | | 7 | 6 | 2 | |
| LD | TERRASTAR | 2026 | 8 | | 6,5 | 4,5 | 8 | (6) | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | (9) | | | 8 | 6 | 3,3 | |
| LD | TRIATTACK | 2026 | 6 | | 6,5 | 6 | 7 | (6,5) | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | (7) | | | 6 | 7 | 4,1 | |
| FD | TRIPERF | 2024 | 2 | 4 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | | 4 | 7 | 4 | 3,7 |
| FD | TRISCORE | 2026 | 7 | | 7 | 5 | 7 | (5,5) | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | (6) | | | 6 | 4 | 3,6 | |

Variétés inscrites en 2026

(h) : hybride

* Attention aux risques de contournements

(1) : Cotation basée sur les pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide. Pour le triticale, cette cotation est établie dans un contexte dominé par l'oïdium et la rouille jaune.

(2) : Protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

Codes obtenteurs / représentants et légende du tableau : en rabat de couverture

2 PRÉCOCITÉ DES VARIÉTÉS

RYTHME DE DÉVELOPPEMENT DES VARIÉTÉS : PRÉCOCITÉS À MONTAISON ET ÉPIAISON

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------|
| PRÉCOCITÉ À ÉPIAISON * | Ultra Précoce 8 | | | | | | BIKINI |
| | Très Précoce 7,5 | | | | | (REQUIN) ♥ | |
| | Précoce 7 | | | BONJOUR | (RAPACE) | RGT OMEAC RGT RUSTILAC ♥ | |
| | ½ Précoce 6,5 | (PROMISO) ♥ | ALLROUNDER PZO RGT ZIGZAC | LUMACO ♥ GALAXOR ♥ (REPTIL) (RUGIRO) | BREHAT (PADDLE) RAMDAM | BIATHLON KITESURF RAFTING ♥ (RENDEZVOUS) RGT QUATERBAC TRIPERF | BICROSS ♥ |
| | ½ Tardif à ½ Précoce 6 | | BILBOQUET RGT RUTENAC ♥ | | (CURLING) | (CHARME) | |
| | ½ Tardif 5,5 | | | | | | |
| <i>Groupe</i> | Très Tardif 0 | Tardif 1 | ½ Tardif 2 | ½ Précoce 3 | Précoce 4 | Très Précoce 5 | |
| PRÉCOCITÉ À MONTAISON ** | | | | | | | |

Les variétés précoces à montaison doivent être semées tard

Entre () : positionnement à confirmer par des observations complémentaires

* Source des données d'essais : ARVALIS / GEVES



** Source des données d'essais : ARVALIS

En *italique* : source Semences de France

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Couleur | Caractéristiques physiologiques | | | | Résistances aux maladies | | | Qualité technologique | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------|---------------------------------|---------------------|---------|-------|--------------------------|--------------------|-----|-----------------------|------------------|----|
| | | | | Alternativité | Précocité épisaison | Hauteur | Verse | Oïdium* | Rouille Couronnée* | PMG | Protéines | Teneur en amande | PS |
| KWM | KWS ALEZANT | 2026 | Noire | 3 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | | 5 | | 4,5 | 5 | 7 |
| KWM | KWS CROQUANT | 2023 | Blanche | 4 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | (7) | 5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 7 |
| KWM | KWS PURSANT | 2021 | Noire | (4) | 6,5 | 4,5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4,5 | 4,5 | 6 |
| KWM | KWS SULTANT  | 2022 | Noire | (4) | 6,5 | 5 | 5 | (7) | 5 | 7 | 4 | 4,5 | 7 |
| RAG | RGT BLACK HARAS | 2019 | Noire | 4 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| RAG | RGT BLACK STAR  | 2023 | Noire | 4 | 6,5 | 5 | 5 | (8) | 7 | 5,5 | 5 | 5,5 | 8 |
| RAG | RGT MONTBLANC | 2021 | Blanche | (3) | 6 | 4,5 | 5,5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5,5 | 7 |
| RAG | RGT NACRE | 2025 | Blanche | 3 | 6 | 5 | 5,5 | | 8 | | 4,5 | 6,5 | 7 |
| RAG | RGT SOUTHWARK | 2019* | Blanche | | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 6 | | | | 6 |
| SP | SW DALGUISE | 2005 | Blanche | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| KWM | VODKA | 2014 | Blanche | 4 | 6 | 4,5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |

Variétés inscrites en 2026

* Attention aux risques de contournements

Variété inscrite en Grande Bretagne, puis inscrite en France en 2019 suite au BREXIT.

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES
Codes obtenteurs / représentants et légende du tableau : en rabat de couverture

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Caractéristiques physiologiques | | | Résistances aux maladies | | | | | Qualité technologique | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|---------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|----|-----------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | Précocité épilaison | Hauteur | Verse | Oïdium* | Rhynchosporiose | Helminthosporiose | Rouille naine* | Ramulariose | PMG | PS | Calibrage | Protéines | Faible activité lipoxygénasique | Faible teneur en Diméthyle sulfate | Avis Maltterie (CBMO) |
| SEC | CB SCORE | 2021 | 5 | 4 | (5) | 7 | 6 | 7 | 6 | | 4 | 4 | 8 | 4 | oui | oui | |
| SEC | EXPLORER | 2011 | 5,5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | | | Préf** |
| KWM | KWS THALIS | 2021 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | (6) | 5 | 5 | 7,5 | 4 | oui | | Préf |
| RAG | LAUREATE | 2017 | 4,5 | 4,5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | (6) | 6 | 4 | 8 | 4 | | | Préf |
| LG | LG ALLEGRO | 2024 | 5 | 4 | 6,5 | 8 | 6 | 6 | 7 | | 7 | 5 | 8 | 4 | | | Obs 1 |
| LG | LG BAROK | 2025 | 5 | 4 | 6 | (7) | 5 | 5 | 7 | | 7 | 5 | 8 | 3,5 | | | Obs 1 |
| UNI | MAGNITUDE | 2023 | 5,5 | 4 | 6,5 | (7) | (6) | 6 | 8 | | 7 | 5 | 8 | 4 | | | Obs 2 |
| AO | MONETA | 2026 | 5 | 4,5 | 4 | 8 | | 6 | 6 | | | 4 | 7,5 | 4 | | | Val |
| RAG | RGT PLANET | 2014 | 5,5 | 4 | 5,5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7,5 | 4 | | | Préf |
| SEC | SAILER | 2025 | 5 | 4 | 6 | (7) | 6 | 6 | 5 | | (7) | 4 | 7,5 | 4 | oui | oui | Obs 1 |
| SU | STING | 2023 | 5,5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | | 8 | 6 | 8 | 4 | | | Préf |
| SEC | TIMBER | 2024 | 5,5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | | 7 | 4 | 8 | 4 | | | Obs 1 |
| SEC | TRAVELER | 2011 | 5,5 | 4 | 6 | 7 | 8 | | 7 | | 7 | 6 | 8 | 4,5 | | | |

Variétés inscrites en 2026

* Attention aux risques de contournements

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES
Codes obtenteurs / représentants et légende du tableau : en rabat de couverture

GAMME SEMENCES DE FRANCE

| UNI | FONTANE | 2025 | Epi. | H. | V. | Di. | Rhyn. | Hel. | R. N. | Ramu. | PMG | PS | Cal. | Prot. | Lipo. | Dimé. | CTPS | Avis |
|-----|---------|------|------|----|----|-----|-------|------|-------|-------|-----|----|------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 5,5 | | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | | | 6 | 8 | 4 | | | | |

Source des données : Semences de France

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.
Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

| Obtenteur / Représentant | Nom | Année d'inscription | Couleur | Caractéristiques physiologiques | | | Résistances aux maladies | | PMG | Qualité technologique | | |
|--------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------|---------|-------|--------------------------|--------------------|-----|-----------------------|------------------|----|
| | | | | Précocité épiaison | Hauteur | Verse | Oïdium* | Rouille Couronnée* | | Protéines | Teneur en amande | PS |
| AO | CANDICE ♡ | 2026 | Blanche | 6,5 | 5,5 | 6 | (4) | 6 | | 4 | 6 | 7 |
| AO | CELESTE ♡ | 2019 | Noire | 6 | 5,5 | 6 | 4 | 5 | 7,5 | 4,5 | 6,5 | 8 |
| AO | CITADELLE | 2025 | Noire | 6 | 5 | 5,5 | (6) | 5 | | 4,5 | 6 | 8 |
| LD | DUFFY | 2007 | Blanche | 6 | 5 | 4,5 | 5 | 4 | 6 | 4,5 | 6 | 8 |
| LD | HUCUL | SK-17 | Noire | 6 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | | | | 6 |
| KWM | KWS BALIOS | 2018 | Noire | 5,5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 8 |
| KWM | KWS LONCHANT ♡ | 2025 | Noire | 6 | 5 | 6 | (5) | 7 | | 4,5 | 6,5 | 9 |
| KWM | KWS OCRE | 2020 | jaune | 6 | 5 | 5,5 | 8 | 4 | 6,5 | 4 | 6 | 8 |
| KWM | KWS OPALINE | 2019 | Blanche | 6 | 4,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 6,5 | 9 |
| KWM | KWS TITANT ♡ | 2023 | Blanche | 6 | 5 | 5,5 | 8 | 5 | 7 | 3,5 | 6,5 | 7 |
| KWM | KWS URANIE | 2019 | Noire | 6 | 4,5 | 6 | 6 | 7 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 9 |
| SU | PLATIN | AT-20 | Jaune | | | | | | | | | |
| RAG | RGT KAOLITE | 2026 | Blanche | 6 | 5 | 7 | (8) | 5 | | 4 | 6 | 6 |
| SU | SCOTTY | DE-21 | Blanche | 5,5 | 6 | 6 | 8 | 4 | | | | 4 |

Variétés inscrites en 2026

* Attention aux risques de contournements

 Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES
Codes obtenteurs / représentants et légende du tableau : en rabat de couverture

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux et des techniques de culture.

| Nom | Année et pays d'inscription | Représentant | Productivité (indice rendement graines - %) | | | | Tolérance au froid | Tolérance à la verse à maturité | Précocité | | Hauteur | Classe de PMG (g) | Teneur Protéines (% MS) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-------|-------|-------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|-------------------|-------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | | Floraison | Maturité | | | |
| ARKTIS | 2023 UE | Saaten Union | 101,5 | - | - | - | - | T | mi-tardive | mi-tardive | courte | >550 | élevée |
| AXEL | 2014 FR | Sem Partners | 111,3 | 112,3 | 108,9 | 109,3 | MT | AT | mi-précoce | mi-précoce | moyenne | >550 | moyenne |
| CURLEW | 2023 FR | RAGT Semences | 100,0 | - | - | - | MT | AT | mi-précoce | tardive | moyenne | >550 | faible |
| DIVA | 2001 FR | Agri Obtentions | - | 89,3 | 94,5 | 93,4 | T | AT | mi-précoce | mi-précoce | moyenne | 450-500 | Moy. |
| GL ALICE | 2017 UE | SECOBRA | 102,2 | 108,3 | 99,5 | 101,2 | T* | TT | tardive | mi-tardive | haute | 500-550 | faible |
| IRENA | 2001 FR | Agri Obtentions | - | 90,6 | 99,8 | 93,0 | MT | T | précoce | précoce | Courte | 450-500 | Elevée |
| NAIROBI | 2021 FR | Agri Obtentions | 99,4 | 98,6 | 108,4 | 105,7 | MT | TT | mi-tardive | mi-tardive | moyenne | >550 | très élevée |
| NEPAL | 2023 FR | Agri Obtentions | 100,8 | 109,2 | - | - | T | T | mi-précoce | mi-tardive | moyenne | >550 | élevée |
| NEWTON | 2024 FR | Saatbau France | 100,5 | - | - | - | AT | T | tardive | mi-tardive | haute | 450-500 | élevée |
| NOUMEA | 2021 FR | Agri Obtentions | 100,3 | 104,5 | 93,7 | 101,4 | T | T | tardive | tardive | moyenne | 500-550 | élevée |
| PATAGONIA | 2023 FR | RAGT Semences | 100,5 | - | - | - | MT | T | mi-précoce | mi-précoce | moyenne | 500-550 | très élevée |
| Moyenne Rendement (q/ha) | | | 39,8 | 42,7 | 42,9 | 37,5 | | | | | | | |
| Nombre d'essais | | | 12 | 12 | 18 | 11 | | | | | | | |

Source : réseau Terres Inovia, GEVES/CTPS, FNAMS et partenaires

Légendes

Tolérance
S: sensible
AS: assez sensible
MT : moyennement tolérant
AT : assez tolérant
T: tolérant
TT: très tolérant



Précocité
P: précoce
T: tardif

Inter: intermédiaire
Moy.: moyen

- : pas d'info
* : à confirmer
(¹): fleurs blanches

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux et des techniques de culture.

| Nom | Représentant | Année et pays d'inscription | Productivité (indice rendement graines - %) | | | | Teneur vaine convivée | Tolérance à la verse à maturité | Classe de PMG (g) | Teneur Protéines (% MS) | Précocité | | Hauteur |
|---|-----------------|-----------------------------|--|-------|-------|------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|---------|
| | | | 2025 | 20234 | 2023 | 2022 | | | | | Floraison | Maturité | |
| ALLISON | RAGT Semences | 2019 FR | - | - | 96,3 | 98 | faible | T | 450-500 | moyenne | mi-précoce | précoce | moyenne |
| CALLAS  | Saaten Union | 2022 UE | 101,8 | 99,8 | 104,7 | 110 | faible | T | 450-500 | élevée | mi-précoce | mi-précoce | haute |
| CAPRICE | Saaten Union | 2018 FR | 103,4 | 101,8 | 102,5 | 101 | élevée | T | 450-500 | élevée | mi-précoce | mi-précoce | haute |
| NAKKA | AgriObtentions | 2015 FR | - | - | - | - | faible | AT | 450-500 | élevée | mi-précoce | mi-précoce | moyenne |
| NOTILUS | Agri Obtentions | 2023 FR | 100,5 | 108,9 | - | - | élevée | T | 500-550 | élevée | mi-tardive | mi-précoce | moyenne |
| SYNERGY  | Saaten Union | 2022 UE | 96,5 | 102,5 | 102,2 | 103 | faible | T | 400-450 | très élevée | mi-précoce | mi-précoce | haute |
| TIFFANY | RAGT Semences | 2013 FR | - | - | 94,8 | 96 | faible | T | 400-450 | élevée | mi-précoce | mi-précoce | haute |
| VICTUS | RAGT Semences | 2017 FR | - | - | 98,3 | 101 | faible | T | 450-500 | élevée | précoce | précoce | courte |
| YODA | Saaten Union | 2024 FR | 101,9 | - | - | - | faible | T | 450-500 | élevée | mi-précoce | précoce | haute |
| Moyenne Rendement (q/ha) | | | 56,1 | 44,6 | 37,8 | 38,4 | | | | | | | |
| Nombre d'essais | | | 15 | 12 | 12 | 11 | | | | | | | |

Source : réseau Terres Inovia, GEVES/CTPS, FNAMS et partenaires

| | | | |
|----------|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| Légendes | Tolérance | Précocité | - : pas d'info |
| | MT : moyennement tolérant | P : précoce | * : à confirmer |
| | AT : assez tolérant | T : tardif | (¹) : fleurs blanches |
| | T : tolérant | | |

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux et des techniques de culture.



| Variété | Type | Couleur fleurs | Représentant en France | Année Pays inscription | PRODUCTIVITÉ | | TOLÉRANCE | | PRÉCOCITÉ | | QUALITÉ DE LA GRAINE | | | AUTRE |
|--|------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|-------|-----------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Indice moyen pluriannuel | % essais supérieurs à la moyenne | Froid hivernal | Verse | Floraison | Maturité | Richesse en protéines | Richesse en huile | Classe de PMG (g) | Hauteur à maturité |
| LUPIN BLANC D'HIVER | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Données récoltes 2019 à 2025 réseau Terres Inovia et partenaires (23 essais, rendement moyen = 33,2 q/ha)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ORUS | D.N | bleutée | Cerience | 2010 - FR | 102,6 | 61% | T | T | ½ T | P | élevée | élevée | 300-320 | haute |
| MAGNUS | D.N | bleutée | Cerience | 2013 - FR | 98,3 | 43% | MT | T | P | P | moyenne | très élevée | 300-320 | haute |
| ULYSSE | D.N | grisée | Cerience | 2017 - FR | 99,1 | 43% | MT | T | ½ P | ½ P | Très élevée | moyenne | 360-380 | moyenne |
| <i>Données récoltes 2019 à 2021 et 2024 réseau Terres Inovia et partenaires (13 essais, rendement moyen = 41,6 q/ha)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ANGUS | D.N | blanche | Cerience | 2020 - FR | 117,9 | 92% | MT | T | ½ P | P | moyenne | moyenne | 280-300 | haute |
| LUPIN BLANC DE PRINTEMPS | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Données récoltes 2019 à 2025 réseau Terres Inovia et partenaires (19 essais, rendement moyen = 27,7 q/ha)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| FIGARO | I | bleutée | Cerience | 2015 - FR | 99,3 | 39% | | TT | ½ P | ½ P | très élevée | élevée | 260-300 | moyenne |
| SULIMO | I | bleutée | Cerience | 2015 - FR | 117,5 | 95% | | TT | ½ P | ½ T | élevée | très élevée | 300-340 | moyenne |
| <i>Données récoltes 2019 à 2021 et 2025 réseau Terres Inovia et partenaires (13 essais, rendement moyen = 21,7 q/ha)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| FEODORA | I | bleutée | Cérence | 2004 - DE | 85,6 | 0% | | T | P | P | élevée | élevée | 220-260 | moyenne |
| <i>Données récoltes 2019 à 2023 réseau Terres Inovia et partenaires (15 essais, rendement moyen = 23,3 q/ha)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| AMIGA | I | bleutée | Florimond-Desprez | 1985 - FR | 89,9 | 40% | | TT | ½ P | P | élevée | élevée | 260-300 | courte |
| ENERGY | I | bleutée | Cerience | 2000 - FR | 108,2 | 60% | | TT | ½ T | T | élevée | élevée | 260-300 | haute |
| LUPIN BLEU DE PRINTEMPS (à feuilles étroites) | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Données des essais 2021, 2022 et 2025 - Réseau Terres Inovia et partenaires (5 essais, rendement moyen = 14 q/ha)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| BOREGINE | - | bleutée | Sem Partners | 2003 - DE | 97,5 | 60% | | - | T | - | faible* | faible* | 140-180 | moyenne |
| PROBOR | - | bleutée | Sem Partners | 2005 - DE | 102,5 | 40% | | - | T | - | moyenne* | faible* | 140-180 | courte |

T: Tolérant ; TT: très tolérant ; D: déterminé ; N: nain ; I: indéterminé ; -: pas d'info ; DE: inscription Allemagne ; P: précoce ; T: tardif ; *: à confirmer

Source : réseau Terres Inovia, GEVES/CTPS, FNAMS et partenaires

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux et des techniques de culture.

| Nom | Couleur Graine | Représentant et année d'inscription | Productivité (en indice, 100% = rendement moyen des essais) | | | | Tolérance | | | Teneur en protéines | Classe de PMG (g) | Précocité | | Hauteur à la récolte |
|--|----------------|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | verse à maturité | froid hivernal | chlorose ferrique | | | Floraison | Maturité | |
| AVIRON | verte | Florimond Desprez - 2012 | 98,7 | 104,3 | 103,2 | 98,2 | TT | MT | T | moyenne | <180 | intermédiaire | tardive | haute |
| CASINI | jaune | RAGT Semences - 2020 | | | 93,8 | 93,6 | MT | TT | TT | faible | 220-250 | intermédiaire | précoce | moyenne |
| ESCRIME | jaune | Florimond Desprez - 2018 | | | 104,0 | 99,1 | MT | MT | T | moyenne | 180-200 | précoce | intermédiaire | moyenne |
| FACETTE | corail | Agri Obtentions - 2021 | 85,0 | | | 84,6 | AT | T | - | élevée | 200-220 | tardive | intermédiaire | haute |
| FAQUIR | verte | Agri Obtentions - 2020 | 92,3 | 97,9 | 96,3 | 99,4 | T | MT | MT | élevée | 220-250 | intermédiaire | tardive | haute |
| FARWEST | jaune | Agri Obtentions - 2023 | 101,4 | 103,0 | | | TT | MT | MT | moyenne | 180-200 | intermédiaire | précoce | très haute |
| FEROE | jaune | RAGT Semences - 2021 | 103,0 | 108,6 | 100,9 | 103,7 | TT | TT | T | faible | 180-200 | intermédiaire | tardive | très haute |
| FLOKON | jaune | Agri Obtentions - 2015 | | | | 107,9 | MT | T | MT | moyenne | 180-200 | précoce | inter | courte |
| FOUDRE  | jaune | Agri Obtentions - 2021 | 99,4 | 106,4 | 110,2 | 105,2 | TT | MT | MT | faible | 200-220 | tardive | intermédiaire | très haute |
| FRESNEL | jaune | Agri Obtentions - 2014 | | 90,4 | 88,6 | 97,9 | AT | TT | T | moyenne | 220-250 | précoce | intermédiaire | moyenne |
| FURTIF | jaune | Agri Obtentions - 2021 | 106,2 | 103,9 | 97,3 | 103,1 | T | TT | T | faible | 200-220 | intermédiaire | précoce | moyenne |
| JUMPER  | jaune | Florimond Desprez - 2022 | 105,5 | 117,3 | 100,0 | | AT | MT | T | faible | 180-200 | intermédiaire | précoce | haute |
| RUCK | jaune | Florimond Desprez - 2024 | 105,9 | | | | AT | MT | MT | moyenne | 200-220 | précoce | précoce | moyenne |
| PADDLE | verte | Florimond Desprez - 2020 | 105,5 | 99,6 | 105,8 | 97,9 | AT | T | T | moyenne | <180 | intermédiaire | intermédiaire | moyenne |
| UPPERCUT | jaune | Florimond Desprez - 2021 | 105,9 | 102,3 | 101,9 | 104,6 | MT | T | T | moyenne | <180 | précoce | intermédiaire | moyenne |
| | | <i>Rendement moyen (q/ha)</i> | 53,5 | 42,1 | 48,3 | 51,0 | | | | | | | | |
| | | <i>Nombre d'essais</i> | 16 | 8 | 22 | 21 | | | | | | | | |

Source : réseau Terres Inovia, GEVES/CTPS, FNAMS et partenaires

S : sensible / AS : assez sensible / MT : moyennement tolérant / AT : assez tolérant / T : tolérant / TT : très tolérant

Pois protéagineux de printemps

53

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux et des techniques de culture.

| Nom | Représentant et année d'inscription | Productivité (en indice, 100% = rendement moyen des essais) | | | | Tolérance à la verse à maturité | Teneur en protéines | Classe de PMG (g) | Précocité | | Hauteur à la récolte |
|-----------------------|---|--|-------|-------|-------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | | | Floraison | Maturité | |
| Graines jaunes | | | | | | | | | | | |
| ARCKO | Lemaire Deffontaines - 2023 | 95,6 | 99,6 | | | AT | moyenne | 180-200 | mi-tardive | mi-précoce | moyenne |
| AUTENTIC | LG Semences - 2021 | 101,7 | | | | AT | moyenne | 220-250 | mi-tardive | mi-précoce | moyenne |
| BATIST | Lemaire Deffontaines - 2020 | 99,0 | 101,3 | 101,3 | 100,7 | T | moyenne | 250-270 | mi-précoce | mi-précoce | haute |
| CAPTUR | Lemaire Deffontaines - 2021 | | | 98,6 | 98,4 | AT | très élevée | 200-220 | mi-précoce | mi-précoce | moyenne |
| CORTEX | Lemaire Deffontaines - 2022 | 98,9 | 101,2 | 106,2 | | MT | moyenne | 250-270 | mi-précoce | mi-précoce | courte |
| GABIN | Lemaire Deffontaines - 2024 | 94,3 | | | | T | élevée | 200-220 | mi-précoce | mi-précoce | moyenne |
| ICONIC | RAGT Semences - 2022 | 103,8 | 108,0 | 107,8 | | T | élevée | 220-250 | mi-tardive | mi-précoce | haute |
| KAGNOTTE | KWS Momont - 2018 | | | 98,8 | 102,0 | AT | moyenne | 200-220 | mi-précoce | mi-tardive | moyenne |
| KAMELEON | KWS Momont - 2019 | 98,7 | 99,8 | 100,2 | 98,5 | T | élevée | 220-250 | mi-précoce | mi-précoce | moyenne |
| KAPLAN | Unisigma - 2019 | 99,6 | 99,1 | 99,9 | 101,6 | T | très élevée | 200-220 | mi-tardive | mi-précoce | moyenne |
| KWS FLAM | KWS Momont - 2023 | 103,7 | 109,5 | | | T | moyenne | 200-220 | mi-tardive | mi-tardive | haute |
| KWS TELEGRAM ♡ | KWS Momont - 2024 | 104,0 | | | | MT | élevée | 200-220 | mi-tardive | mi-tardive | moyenne |
| PERCEVAL | RAGT Semences - 2021 | 100,8 | 101,9 | 104,5 | 107,6 | T | élevée | 220-250 | précoce | mi-précoce | moyenne |
| PERSAN ♡ | Unisigma - 2022 | 99,6 | 103,5 | 103,4 | | MT | moyenne | 250-270 | précoce | précoce | moyenne |
| PRALINO | Agri Obtentions - 2024 | 101,0 | | | | AT | moyenne | 220-250 | précoce | précoce | courte |
| | <i>Rendement moyen (q/ha)</i> | 49,1 | 45,7 | 40,8 | 39,1 | | | | | | |
| | <i>Nombre d'essais</i> | 31 | 23 | 27 | 30 | | | | | | |



GAMME SEMENCES DE FRANCE

ORTOLAN ♡ - graines jaunes

Unisigma - 2025

Tol. verse

Prot.

PMG.

Précoc. Fla.

Précoc. Maturité

Hauteur

AT

élevée

250-270

précoce

Intermédiaire

moyenne

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux et des techniques de culture.

| Nom | Représentant et année d'inscription | Productivité (en indice, 100% = rendement moyen des essais) | | | | Tolérance à la verse à maturité | Teneur en protéines | Classe de PMG (g) | Précocité | | Hauteur à la récolte |
|-----------------------|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | | | Floraison | Maturité | |
| Graines vertes | | | | | | | | | | | |
| ATOLL | Agri Obtentions - 2022 | 98,0 | 98 | 99 | | MT | moyenne | 200-220 | mi-tardive | tardive | moyenne |
| CARRINGTON | RAGT Semences - 2020 | 101,5 | 104,3 | 102,5 | 111,3 | T | moyenne | 200-220 | mi-précoce | mi-tardive | haute |
| DAYTONA | Sem-Partners - 2008 | | | 98,2 | 92,7 | MT | moyenne | 220-250 | mi-précoce | tardive | moyenne |
| GENT | Agri Obtentions - 2023 | 98,5 | 101,5 | | | MT | très élevée | 220-250 | mi-précoce | mi-tardive | coute |
| GREENWAY | Lemaire Deffontaines - 2019 | 102,0 | 101,4 | 101,8 | 111,3 | AT | élevée | 250-270 | mi-précoce | mi-précoce | haute |
| KARIOKA | KWS Momont - 2018 | | 94,9 | 100,9 | 94,6 | AT | élevée | 200-220 | mi-tardive | précoce | haute |
| | <i>Rendement moyen (q/ha)</i> | 49,7 | 50,4 | 41,3 | 42,3 | | | | | | |
| | <i>Nombre d'essais</i> | 8 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |

Source : réseau Terres Inovia, GEVES/CTPS, FNAMS et partenaires

S : sensible / AS : assez sensible / MT : moyennement tolérant / AT : assez tolérant / T : tolérant / TT : très tolérant * : à confirmer / **:inscrite hors France

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux et des techniques de culture.

| Groupe de précocité | Nom | Année d'inscription | Pays d'inscription | Représentant en France | Sensibilité à la verse | Sensibilité au sclérotinia | Richesse en protéines | Hauteur 1 ^{ère} gousse | Hauteur des plantes | Productivité (indice de rendement graines - %/moyenne) | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | série 1 | série 2 | série 1 | série 2 | série 1 | série 2 | |
| début 000 | ARNOLD | 2023 | Suisse | SARL Rolly | PS | | faible | moyenne | haute | | | | | | | 103 |
| début 000 | ASTERIX | 2020 | Italie | Farmsaat France | PS | | moyenne | moyenne | haute | | 96 | | | | | |
| début 000 | ES COMANDOR | 2016 | France | CS PRO | PS | | moyenne | moyenne | haute | 94 | 95 | 95 | 96 | 99 | | |
| début 000 | MAGNOLIA PZO | 2021 | Allemagne | Semences de France | PS | | moyenne | moyenne | moyenne | 99 | | 95 | | 97 | | |
| début 000 | NESSIE PZO | 2019 | Autriche | Sem-Partners | PS | | moyenne | moyenne | haute | 97 | | 99 | | 101 | 98 | |
| début 000 | SANKARA | 2022 | France | RAGT Semences | PS | | élevée | moyenne | haute | 102 | | 97 | | | | |
| début 000 | SUSSEX | 2020 | Allemagne | Saaten Union | PS | | moyenne | moyenne | moyenne | | 100 | 97 | | 98 | | |
| | | | | | | | | | | <i>Rendement moyen (q/ha) / Nombre d'essais</i> | | | | | | |
| 000 | AKUMARA | 2022 | Autriche | Semences de France | PS | | moyenne | moyenne | moyenne | | 102 | 101 | | 95 | | |
| 000 | ANCAGUA | 2023 | France | Saatbau France | PS | | moyenne | moyenne | haute | | | 105 | | 102 | | |
| 000 | APOLLINA | 2021 | Autriche | Saatbau France | PS | | moyenne | moyenne | haute | 109 | | 109 | | 99 | | |
| 000 | ES CHANCELLOR | 2021 | Pologne | CS PRO | PS | | moyenne | moyenne | haute | 102 | | 104 | | | | |
| 000 | GL BEGONIA | 2023 | France | Agri-Obtentions | PS | | élevée | moyenne | courte | | | 98 | | 98 | | |
| 000 | IMPALA PZO | 2025 | Pologne | Secobra | PS | | moy/élevée* | moyenne | haute | | | | | | | 94 |
| 000 | LID DIAMANTOR | 2022 | France | CS PRO / Semences de France | PS | | élevée | moyenne | moyenne | 97 | | 103 | | 96 | | |
| 000 | PAPRIKA | 2020 | Autriche | Semences de France | PS | | moyenne | moyenne | moyenne | | | | 104 | | | |
| 000 | PRO HELICON | 2023 | France | Semences de Provence | PS | | très élevée | basse | moyenne | | | 99 | | 90 | | |
| 000 | PRO JACINTO | 2023 | Belgique | Protéalisis | AS | | moyenne | moyenne | haute | | | | 108 | | | |
| 000 | PRO VESUVIO | 2023 | France | Semences de France | PS | | élevée | basse | moyenne | | | 104 | | | | |
| 000 | PROTELINE | 2022 | Allemagne | Farmsaat France | PS | | moyenne | moyenne | haute | | 109 | | | | | |
| 000 | RGT SPHINXA | 2019 | France | RAGT Semences | PS | | élevée | moyenne | moyenne | 103 | 102 | 100 | 102 | 100 | 98 | |
| 000 | SEGURA | 2023 | France | RAGT Semences | AS | | moyenne | moyenne | haute | | | 103 | | 102 | | |
| 000 | SORETA | 2024 | France | Florimond-Desprez | PS | | moyenne | moyenne | haute | | | | | 104 | | |
| 000 | STAPELIA | 2022 | France | RAGT Semences | PS | | élevée | moyenne | haute | 108 | | 97 | | | | |
| | | | | | | | | | | <i>Rendement moyen (q/ha) / Nombre d'essais</i> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 37,7 / 15 | 37,0 / 15 | 34,2 / 15 | 34,7 / 13 | 34,6 / 11 | 35,8 / 12 | |
| | | | | | | | | | | 37,7 / 15 | 37,0 / 15 | 34,2 / 15 | 34,7 / 13 | 34,6 / 11 | 35,8 / 12 | |

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux et des techniques de culture.

| Groupe de précocité | Nom | Année d'inscription | Pays d'inscription | Représentant en France | Sensibilité à la verse | Sensibilité au sclérotinia | Richesse en protéines | Hauteur 1 ^{re} gousse | Hauteur des plantes | Productivité (indice de rendement graines - %/moyenne) | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | | 00 | ADELFA | 2020 |
| 00 | AMEVA | 2022 | Autriche | Secobra | PS | | moyenne | moyenne | moyenne | 109 | 100 | |
| 00 | ANNABELLA | 2022 | France | Semences de France | PS | | moyenne | moyenne | haute | 103 | 104 | 101 |
| 00 | AUSTRALIA | 2022 | Autriche | Semences de France | PS | | moyenne | haute | haute | | 118 | 106 |
| 00 | ES MENTOR | 2009 | France | CS PRO / Semences de France | PS | | élevée | moyenne | courte | 99 | 92 | 94 |
| 00 | GL DORI | 2024 | Autriche | Secobra | PS | | moyenne | moyenne | haute | | | 97 |
| 00 | LID CONSTRUCTOR | 2022 | France | CS PRO / Gaillard | AS | | moyenne | moyenne | moyenne | 96*** | 104 | 104 |
| 00 | LID DETECTOR | 2023 | Roumanie | CS PRO / Semences de France | PS | | élevée | moyenne | courte | | 92** | 100 |
| 00 | LID YENDOR | 2024 | Hongrie | CS PRO / Semences de France | PS | | élevée | moyenne | moyenne | | | 102 |
| 00 | PROLIX | 2023 | France | SARL Rolly | PS | | élevée | moyenne | moyenne | | 94*** | 96 |
| 00 | RGT STUMPA | 2015 | France | RAGT Semences | PS | | moyenne | moyenne | moyenne | 95 | 100 | 96 |
| 00 | SIMPOL | 2022 | France | SARL Rolly | PS | | moyenne | moyenne | courte | 99*** | | |
| 00 | SOFLO | 2023 | France | Florimond-Desprez | PS | | élevée | moyenne | moyenne | | 99 | 97 |
| 00/0 | ALGEBRA | 2023 | Autriche | Saatbau France | AS | | moyenne | moyenne | moyenne | | | 106 |
| 00/0 | LID EDUCATOR | 2023 | France | CS PRO | PS | | élevée | moyenne | courte | | 100 | 99 |
| <i>Rendement moyen (q/ha) / Nombre d'essais</i> | | | | | | | | | | <i>43,6 / 8</i> | <i>37,7 / 11</i> | <i>34,6 / 11</i> |
| 0 | ABIZA | 2022 | Croatie | Saatbau France | PS | PS/TPS* | moyenne | moyenne | haute | 90 | 99 | |
| 0 | ALAMEDA | 2020 | Autriche | Saatbau France | PS | - | élevée | moyenne | haute | | | 88 |
| 0 | ARTESIA | 2023 | France | Mas Seeds | PS | - | moyenne | moyenne | moyenne | | 105 | 98 |
| 0 | CAMERON | 2023 | Italie | APSOV / Gaillard | PS | - | moyenne | moyenne | moyenne | 105 | 96 | 99 |
| 0 | GL LILAS | 2022 | France | Agri Obtentions | PS | PS/TPS* | élevée | moyenne | moyenne | 100 | 105 | |

⁽¹⁾ La variété PROLIX présente des densités plus faibles dans au moins 1 essai sur 2, les résultats de cette variété sont donc à relativiser

2 CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

Ces informations comparatives sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux et des techniques de culture.

| Groupe de précocité | Nom | Année d'inscription | Pays d'inscription | Représentant en France | Sensibilité à la verse | Sensibilité au sclérotinia | Richesse en protéines | Hauteur 1 ^{ère} gousse | Hauteur des plantes | Productivité (indice de rendement graines - %/moyenne) | | |
|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | | Rendement moyen (q/ha) / Nombre d'essais | | |
| 0 | LID BOUTONDOR | 2023 | France | CS PRO | PS | PS* | élevée | moyenne | moyenne | | 108 | 108 |
| 0 | RGT SICILIA | 2021 | France | RAGT Semences | PS | PS/TPS* | élevée | moyenne | moyenne | 110 | 104 | 107 |
| 0 | RGT SPEEDA | 2014 | France | RAGT Semences | PS | PS | élevée | moyenne | haute | 94 | 98 | 101 |
| 0 | RGT STARBELA | 2018 | France | RAGT Semences | PS | S | élevée | haute | haute | 96 | 103 | 99 |
| | | | | | | | | | | Rendement moyen (q/ha) / Nombre d'essais | | |
| | | | | | | | | | | 41,1 / 7 | 43,8 / 7 | 41,6 / 8 |
| I | AVATAR | 2018 | Italie | Saaten Union | PS | S* | élevée | moyenne | courte | 105 | 104 | |
| I | ES CONQUEROR | 2021 | Hongrie | CS PRO | PS | PS/TPS* | élevée | basse | courte | 98 | 95 | |
| I | ES GENERATOR | 2021 | Hongrie | CS PRO | PS | PS/TPS* | élevée | moyenne | haute | 103 | 98 | 102 |
| I | ES PALLADOR | 2015 | France | CS PRO | PS | S | élevée | haute | moyenne | 107 | 103 | 105 |
| I | ISIDOR | 2004 | France | CS PRO / Actisem | PS | PS | élevée | moyenne | courte | 97 | 94*** | 97 |
| I | RGT SINEMA | 2017 | France | RAGT Semences | PS | PS | moyenne | haute | haute | 94 | 101 | 98 |
| I | RGT STOCATA | 2019 | France | RAGT Semences | PS | TPS | élevée | moyenne | courte | 98 | 101 | 97 |
| I | RGT STRAVIATA | 2019 | France | RAGT Semences | PS | AS | élevée | moyenne | courte | 107 | 99 | 108 |
| I/II | EKAM | 2020 | Italie | GMAX Seeds | PS | - | moyenne | basse | courte/moy | 102 | | |
| I/II | ES CONNECTOR | 2021 | Croatie | CS PRO | PS | S | élevée | moyenne | courte | 106 | 106 | |
| | | | | | | | | | | Rendement moyen (q/ha) / Nombre d'essais | | |
| | | | | | | | | | | 41,6 / 7 | 44,1 / 9 | 44,7 / 8 |

■ sensible ■ assez sensible ■ peu sensible ■ très peu sensible

* à confirmer

Rendement moyen (q/ha) / Nombre d'essais

**variété évaluée en 000 série 2

***La variété PROLIX, ISIDOR, LID CONSTRUCTOR et SIMPOL présente des densités plus faibles dans au moins 1 essai sur 2, les résultats de cette variété sont donc à relativiser


Source : Réseau Terres Inovia, GEVES/CTPS et partenaires

GAMME SEMENCES DE FRANCE

| | Nom | Année | Pays | Rep. en Fr | Verse | Sclérot. | Rich. prot | Haut 1 ^{er} g | Hauteur pl | Prod 2023 | Prod 2024 | Prod 2025 |
|-----|---------------|-------|-------------------|----------------------------|-------|----------|------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 000 | AFORIA | | | Semences de France | | | | | | | | |
| 00 | ATACAMA | 2018 | Autriche | Semences de France | PS | | moyenne | moyenne | moyenne | | | |
| 0 | LID AVENTADOR | 2025 | Slovaquie/Croatie | CS PRO/ Semences de France | TPS | PS | moyenne | moyenne | haute | | | |

Source des données : Semences de France

Une gamme soja régénérée



GAMME SDF

NOS VALEURS SÛRES



VARIÉTÉ ÉGALEMENT DISPONIBLE EN BIO

3 LISTES DES VARIÉTÉS RECOMMANDÉES

| | Panifiables | | | | | | BAF | | | Correcteurs | Biscuitiers | |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| Variétés Recommandées par la Meunerie (VRM) | ACADEMY | HEMINGWAY | KWS ASTRUM ^{EXT} | LG ABILENE | PONDOR ♡ | RGT MONTECARLO ♡ | SU HYCARDI | ACTIVITY | FEDERIS | LG AGRIATE | RGT VALPARAISO SU TARRAFAL SY TRANSITION | ARKEOS COSMIC HANSEL LG NIKLAS SU ECUSSON |
| | APACHE ^{EXT} | HYLIGO | KWS EXTASE | LG ABRAZO | PRESTANCE | RGT PACTEO | SU HYLORD | ADESSO | FORCAL ^F | LG ANOUK | | |
| conduite agricole conventionnelle | BALZAC | INTENSITY ^{EXT} ♡ | KWS GLOBE ♡ | LG ABSALON | PROVIDENCE | RGT PROFUSIO ♡ | SU MASTER ♡ | ALESSIO | GIAMBLOGNA | LID FORLANE ^S | | |
| | CONQUISTADOR ♡ | JERIKO ^{EXT} ♡ | KWS MILLESIME ^{EXT} ♡ | LG AIKIDO | RGT INDEXO | RGT SUNDEO | SU SAUVIGNON ♡ | BEAUREGARD | IZALCO CS | LID GATINEL | | |
| | FABULOR ♡ | JUNIOR ♡ | KWS PARFUM | LG ARLETY | RGT KOESIO | RGT LETSGO | SHREK | BOLOGNA | KWS CONSTELLUM | REBELDE | | |
| | FACILITY ♡ | KAKTUS ♡ | KWS PERCEPTUM ♡ | LG AUDACE | RGT LOOKEO ♡ | SU ADDICTION | SY ADMIRATION | CHEILLON | KWS CRITERIUM | SU CORRECTION ^S | | |
| | GRAVELINE ^{EXT} | KAROQUE | KWS SPHERE | OUTDOOR ♡ | RGT LUXEO | SU HYBISCUS | THERMIDOR ♡ | CHRISTOPH | KWS FORTICIUM ^S | TEOREMA ^S | | |
| | GREKAU ^{EXT} | KINGKONG ♡ | KWS ULTIM | PIBRAC | | | | | | | | |
| conduite agricole biologique | ABRACADABRA | APEXUS ♡ | CHRISTOPH | GLENAN | LENNOX | PHILDOR ♡ | TOGANO | | | | | |
| | ADESSO | ARAMEUS | FORCALI | IZALCO CS | LID GATINEL | SU TARRAFAL | WENDELIN | | | | | HANSEL |
| | ALESSIO | AURELIUS | GENY | LD CHAINE | MONTALBANO ♡ | TENGRİ | WITAL | | | | | LD GUSTE SU ECUSSON |
| Blés Pour la Meunerie Française (BPMF) | ACADEMY | GARFIELD | KARABOL | LG ABILENE | PONDOR ♡ | RGT PROFUSIO ♡ | SU HYLORD | ACTIVITY | FEDERIS | LG AGRIATE | ENERGO | ARKEOS |
| | ACCOMPLY | GENERIK | KAROQUE | LG ABRAZO | PRESTANCE | RGT PROFUSIO ♡ | SU HYREAL | | | | | |
| conduite agricole conventionnelle | ADVISOR | GEOPOLIS | KINGKONG ♡ | LG ABSALON | PROVIDENCE | RGT SUNDEO | SU HISTORIC | ALESSIO | GIAMBLOGNA | LID FORLANE ^S | RGT VALPARAISO | COSMIC |
| | APACHE ^{EXT} | GRAVELINE ^{EXT} | KWS ASTRUM ^{EXT} | LG ACADIE | RGT FARMEO | RGT WINDO | SU MASTER | BEAUREGARD | IZALCO CS | LID GATINEL | SU TARRAFAL | HANSEL |
| | ARCACHON | GREKAU ^{EXT} | LG AERO | LG ACADIE | RGT INDEXO | SHREK | SU PULSION | BOLOGNA | KWS CONSTELLUM | REBELDE | SY TRANSITION | LG NIKLAS |
| | BALZAC | HEMINGWAY | KWS EXTASE | LG AIKIDO | RGT KOESIO | SPIROU | SU SAUVIGNON ♡ | CHEILLON | KWS CRITERIUM | SU CORRECTION ^S | | SU ECUSSON |
| | BELZEBUTH ^{EXT} | HYLIGO | KWS GLOBE ♡ | LG ARLETY | RGT LETSGO | SU ADDICTION | | CHRISTOPH | KWS FORTICIUM ^S | TEOREMA ^S | | |
| | CELEBRITY ^{EXT} | INTENSITY ^{EXT} ♡ | KWS MILLESIME ^{EXT} ♡ | LG AUDACE | RGT LOOKEO ♡ | SU HORIZON ♡ | | | | | | |
| | CHEVIGNON ♡ | INTRODUCTOR | KWS PARFUM | LID PAVANE | RGT LUXEO | SU HYANKEE ^{EXT} | | | | | | |
| | CONQUISTADOR ♡ | JERIKO ^{EXT} ♡ | KWS PERCEPTUM ♡ | OLAF | RGT MAJESKO | SU HYBISCUS | | | | | | |
| | FABULOR ♡ | JUNIOR ♡ | KWS SPHERE | OUTDOOR ♡ | RGT MONTECARLO ♡ | SU HYCARDI | | | | | | |
| | FACILITY ♡ | KAKTUS ♡ | KWS ULTIM | PIBRAC | RGT PACTEO | SU HYCLASS | | | | | | |
| conduite agricole biologique | ABRACADABRA | ARAMEUS | CHRISTOPH | GLENAN | LENNOX | RGT CAPEXO | WENDELIN | | | | | |
| | ADESSO | AURELIUS | ENERGO | IZALCO CS | LID GATINEL | SU TARRAFAL | WITAL | | | | | HANSEL |
| | ALESSIO | CAMILLUS ♡ | FORCALI | LD CHAINE | MONTALBANO ♡ | TENGRİ | | | | | | LD GUSTE |
| | APEXUS ♡ | CHEVIGNON | GENY | LD VOILE | PHILDOR ♡ | TOGANO | | | | | | SU ECUSSON |
| Variétés en Observation (VO) | ALLSOME | FUNNY ♡ | GRIFONDOR ♡ | KWS Foudre | LG ALLURE ^{EXT} | RGT ARPEGIO ♡ | SU SNIPPER ♡ | CELEBI | LID SALTAREL ♡ | MV JUTAS ^S | AGEN | ACROBATIC |
| | DUMBLEDDOR ♡ | GANDY | KASSIAN | LG AIRFORCE | LG AVALON | RGT SPACIO | SU TUCSON | | | | | |
| conduite agricole conventionnelle | | | | | | | | | | | | |
| conduite agricole biologique | CIAN | KWS CONSTELLUM | | | | | | | | | | |

EXT : Extensible S : Souple

* Variété, en cumul, ne devant pas dépasser 15 % dans les mélanges BPMF 2^e année de VO

3 LISTES DES VARIÉTÉS RECOMMANDÉES

CLASSIFICATION BLÉ TENDRE FRANÇAIS

| Classes | Taux de protéines | Force boulangère (W) | Poids spécifique | Indice de chute de Hagberg |
|----------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| Premium (A1) | ≥ 11,5 | ≥ 170 | ≥ 77 | ≥ 240 |
| Supérieur (A2) | ≥ 11 | NS | ≥ 76 | ≥ 220 |
| Médium (A3) | ≥ 10,5 | NS | NS | ≥ 170 |
| Access (A4) | SC | NS | NS | NS |

NS = Non Spécifié / SC : Spécifié au Contrat

LISTE DES ORGES PRÉFÉRÉES*

des Malteurs de France et Brasseurs de France - ORGES DE BRASSERIE RÉCOLTE 2026

| | | ORGES DE PRINTEMPS | ORGES D'HIVER |
|---|---------|---|-----------------------------|
| | | 2 Rangs | 6 Rangs |
| Supérieur à 15 000 ha | Étape 2 | KWS THALIS RGT PLANET STING | KWS FARO CARROUSEL (JNO) |
| Inférieur à 15 000 ha | | LAUREATE | |
| Usage limité | | LEXY | COMTESSE CONSTEL (JNO) |
| Variétés en observation commerciale et industrielle | Étape 2 | LG FLAMENCO LG RHAPSODY MAGNITUDE | KWS DELIS (JNO) |
| | Étape 1 | LG ALLEGRO TIMBER BUZZER | DUCHESSE |
| Variétés admises en validation technologique | | LG BAROK SAILER | |

LISTE DES VARIÉTÉS DE BLÉS DURS - LISTE VRSP 2026 recommandée par la commission Qualité des Industriels (SEMOULIERS ET PASTIERS)

| liste VRSP 2023 | Zones géographiques de référence | Indice Rendement Semoulier | Indice Aspect Semoule et Pâtes | Indice Tenue à la Cuisson |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ANVERGUR* ♥ | nord et sud | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |
| RGT BELALUR* ♥ | nord et sud | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ |
| CABAYOU | nord et sud | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ |
| CLAUDIO | sud est | ■ | ■ | ■ ■ |
| FORMIDOU | nord et sud | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ |
| RGT INSIEMUR | nord et sud | ■ ■ | ■ | ■ ■ |
| RELIEF | nord et sud | ■ | ■ | ■ ■ |
| ROCAILLOU ♥ | nord et sud | ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |
| RGT VOILUR ♥ | nord et sud | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ |

*Témoins de référence dans toute les années d'essais, considéré comme équilibré et stable par les industriels.

En observation commerciale et industrielle :

Étape 1 : Variétés ayant subi les tests pilotes IFBM et soumises à des épreuves en site industriel en vue de vérifier que toutes les attentes fonctionnelles de fabrication des Malteurs et des Brasseurs sont respectées Cette période doit permettre à la variété de se développer commercialement.

Étape 2 : Variétés en cours de tests industriels en vue de vérifier que toutes les attentes fonctionnelles de fabrication des Malteurs et des Brasseurs sont respectées. Elles doivent être multipliées sur plus de 150 hectares et présenter un intérêt pour un maltteur et un brasseur.

Admises en validation technologique :

Sont admises en validation technologique celles nouvellement inscrites sur la liste à orientation Brasserie du CTPS et proposées par le CBMO aux tests pilotes IFBM.

Usage limité : Variétés adaptées à certains cahiers des charges dont le débouché est à sécuriser

* Certaines variétés dont les surfaces de production ont baissé restent brassicoles : **Sunshine, Explorer, LG Tosca, KWS Fantex, Salamandre, Pixel, Etincel**

BLÉ DUR



CATONE

906GD16/123

BDQ



Très bon PMG

Adapté aux sols superficiels

Très bon taux de protéines



Semences
de France

INTELLIGENCE
AGRICOLE

Blé tendre d'hiver - BP extensible

BATMAN

Le héros de
vos rendements !

- 1/2 précoce à précoce (6,5)
- Très bon PS
- Tolérant piétin-verse



 **SECOBRA**
RECHERCHES



Scannez le QRcode,
répondez à 3 questions
et tentez de
gagner le gros lot !



4 PROTECTION DES SEMENCES

RAPPEL : Pour contribuer à une meilleure protection de l'environnement et préserver la santé des utilisateurs de produits antiparasitaires et la qualité sanitaire des productions céréalières, il est recommandé de limiter le risque de développement du parasitisme par la mise en œuvre d'itinéraires culturaux adaptés : utilisation de variétés tolérantes, rotation, gestion des résidus de culture, date de semis adaptée... En saison, estimer les risques d'infestation des parcelles, consulter les Bulletins de Santé du Végétal et utiliser les préconisations issues des outils d'aide à la décision.

Code de Bonnes Pratiques Agricoles, d'après le document BPA de la DGAL lors de l'utilisation de semences traitées avec un produit phytosanitaire

Pour votre sécurité : lire très attentivement l'étiquette, et se conformer aux précautions qui y sont mentionnées. Porter des équipements de protection individuelle (gants, masque, lunettes, combinaison de travail) lors du remplissage et de la vidange du semoir. Remplissage : se positionner dos au vent pour l'ouverture du sac, ne pas secouer le fond du sac pouvant contenir des poussières accumulées pendant le transport. Ne pas brasser les semences traitées dans la trémie avec les mains, utiliser un outil adapté.

Pour le respect du milieu : remplir le semoir à l'intérieur du champ (à plus de 10 mètres du bord, en évitant la proximité de ruchers, haies, cultures en fleurs). Veiller à ne pas laisser de semences sur le sol après avoir réalisé les réglages du semoir. Pour protéger les oiseaux et les mammifères, ne pas laisser de semences à la surface du sol, bien les enfouir dans le sol, y compris en bout de sillon.

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES ET SIGLES UTILISÉS* * Les informations citées ne sont pas exhaustives

Le nouvel étiquetage européen **CLP** (Classification, Labelling, Packaging), est obligatoire à partir du 1^{er} juin 2015.

STOCKAGE SEPARÉ : doivent être rangés séparément des autres produits, selon le nouvel étiquetage des produits phytosanitaires (CLP)

- produits T, T+ou CMR ayant sur l'étiquette le picto  avec une des phrases H340, H341, H350, H351, H360, H361.

RESTRICTION EN MÉLANGES EXTEMPORANES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Certains produits peuvent faire l'objet de restrictions.

Sont interdits selon le nouvel étiquetage des produits phytosanitaires (Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 7 avril 2010), les mélanges avec :

- au moins un produit étiqueté H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360 (- FD, F,D, Fd ou Df), H370 ou H372 ;
- au moins deux produits comportant une des mentions de danger H341, H351 ou H371 ;
- ou au moins deux produits comportant la mention de danger H373 ;
- ou au moins deux produits comportant une des mentions de danger H361 (-d, fd, ou f) ou H362.

DVP : **dispositif végétalisé permanent** pour limiter le ruissellement en bordure des points d'eau.

FORMULATIONS

CS : Suspension de capsules

ES : Emulsion pour traitement de semences

FS : Suspension concentrée pour traitement de semences

ME : Micro-émulsion

RÈGLEMENT CLP (Classification, Labelling, Packaging)

Règlement européen de classification, d'étiquetage et d'emballage des produits chimiques.

Mentions de danger (phrases H)

H302 : nocif en cas d'ingestion

H317 : peut provoquer une allergie cutanée

H332 : nocif par inhalation

H335 : peut irriter les voies respiratoires

H361d : susceptible de nuire au fœtus

H373 : risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H410 : très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets à long terme

H411 : toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets à long terme

H412 : nocif pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets à long terme

4 PROTECTION DES SEMENCES

| SPECIALITÉS COMMERCIALES | FIRMES (metteurs en marché) | SUBSTANCES ACTIVES et concentration | Formulation | REGLEMENT CLP Mentions de danger (phrases H) | Stockage séparé | Restriction en mélange (*) | ZNT | Autorisé sur | | | | | | Autorisé en agriculture biologique | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|--|-----------------|----------------------------|-----|--------------|-----------|----------|------|--------|--------|------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | blé | triticale | épeautre | orge | avoine | seigle | | |
| FONGICIDES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinaigre (substance de base) | Qualité alimentaire | acide acétique, au maximum 10% | | | | | | | X | X | X | X | | | UAB |
| TOLTEK ⁽²⁾ | Certis Belchim | Bacillus amyloliquefasciens spp plantarum D747 1x10 ¹⁰ CFU/mL | FS | | non | non | | | X | X | X | X | | | UAB et Bc |
| DIFEND ⁽⁶⁾ | Certis Belchim | difénoconazole 30 g/l | FS | H351, H411 | oui | oui | | X | X | | | | | | |
| CELEST NET ⁽¹⁾ | Syngenta France | fludioxonil 25 g/l | FS | H411 | non | non | | X | X | X | X | X | X | | |
| PREPPER ⁽²⁾ | Certis Belchim | fludioxonil 25 g/l | FS | H317, H318, H411 | non | non | | X | X | X | X | | X | | |
| SPIRATO ⁽¹⁾ | UPL France | fludioxonil 25 g/l | FS | H411 | non | non | | X | X | X | X | X | X | | |
| CELEST GOLD NET | Syngenta France | fludioxonil 25 g/l + difénoconazole 25 g/l | FS | H317, H351, H410 | oui | oui | | X | X | X | X | X | X | | |
| DIFEND EXTRA ⁽²⁾ | Certis Belchim | fludioxonil 25 g/l + difénoconazole 25 g/l | FS | H319, H351, H410 | oui | oui | | X | X | X | X | X | X | | |
| CELEST POWER | Syngenta France | fludioxonil 25 g/l + sedaxane 25 g/l | FS | H317, H332, H351, H411 | oui | oui | | X | X | X | X | X | X | | |
| NEGEV ⁽²⁾ | Certis Belchim | fludioxonil 50 g/l + tébuconazole 10 g/l | FS | H410 | non | non | | X | X | X | X | X | X | | |
| VIBRANCE GOLD | Syngenta France | fludioxonil 25 g/l + difénoconazole 25 g/l + sedaxane 50 g/l | FS | H351, H410 | oui | oui | | X | X | X | X | X | X | | |
| CELEST ORGE NET | Syngenta France | fludioxonil 12,5 g/l + tébuconazole 15 g/l + cyprodinil 25 g/l | FS | H410 | non | non | | | | | X | | | | |
| RUBIN PLUS ⁽²⁾ = SIGONA | BASF France | fludioxonil 33,3 g/l + triticonazole 33,3 g/l + fluxapyroxad 33,3 g/l | FS | H315, H317, H361f, H362, H410 | oui | oui | | X | X | | X | X | X | | |
| SOLEGRI XS ⁽⁷⁾ | BASF France | fluxapyroxad 333 g/l | FS | H317, H362, H410 | oui | oui | | X | X | | X | X | X | | |
| SYSTIVA ⁽³⁾ | BASF France | fluxapyroxad 333 g/l | FS | H317, H362, H410 | oui | oui | | X | X | | X | X | X | | |

4 PROTECTION DES SEMENCES

| SPECIALITÉS COMMERCIALES | FIRMES (metteurs en marché) | SUBSTANCES ACTIVES et concentration | Formulation | REGLEMENT CLP Mentions de danger (phrases H) | Stockage séparé | Restriction en mélange (*) | ZNT | Autorisé sur | | | | | | Autorisé en agriculture biologique |
|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------|--|-----------------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|------|--------|--------|------------------------------------|
| | | | | | | | | blé | triticale | épeautre | orge | avoine | seigle | |
| CERALL ⁽⁴⁾ | Koppert | <i>Pseudomonas chlororaphis</i> MA342 (10 ⁸ -10 ¹⁰ CFU/ml) | FS | néant | non | non | | X | X | | | | X | UAB et Bc |
| REDIGO = MISOL | Bayer CropScience | prothioconazole 100 g/l | FS | H317, H410 | non | non | | X | X | X | X | X | X | |
| REDIGO PRO | Bayer CropScience | prothioconazole 150 g/l + tébuconazole 20 g/l | FS | H410 | non | non | | X | X | X | X | X | X | |
| RAXIL STAR | Semences de France | prothioconazole 100 g/l + tébuconazole 60 g/l + fluopyram 20 g/l | FS | H361d, H400, H410 | oui | oui | | | | | X | X | | |
| LATITUDE XL | Certis Belchim | silthiofam 125 g/l | FS | H373, H412 | non | oui | | X | X | X | | | | |
| PREMIS 25 FS | BASF France | triticonazole 25 g/l | FS | H412 | non | non | | X | X | | X | X | X | |
| FONGI-INSECTICIDES | | | | | | | | | | | | | | |
| AUSTRAL PLUS NET ⁽⁵⁾ | Syngenta France | fludioxonil 10 g/l + téfluthrine 40 g/l | FS | H410 | non | non | 5 m (DVP) | X | X | X | X | X | X | |
| INSECTICIDES | | | | | | | | | | | | | | |
| LANGIS = SIGNAL | UPL France | cyperméthrine 300 g/l | ES | H302, H335, H373, H400, H410 | non | oui | | X | X | X | X | X | X | |
| ATTACK ⁽⁶⁾ | Syngenta France | téfluthrine 200 g/l | CS | H317, H332, H400, H410 | non | non | | X | X | X | X | X | X | |

Légende X Autorisé Non autorisé

Source : ARVALIS - Protection des semences, lutte contre les ravageurs et la verse, en culture et au stockage - Mai 2025

(*) Restriction en mélange : oui = Spécialité potentiellement sujette à une restriction en mélange, mais aucun mélange à intérêt technique avec cette spécialité n'est concerné par la restriction.

(1) Respecter une densité maximale de 240 kg de semences/ha pour le blé, 220 kg/ha pour le triticale, 200 kg/ha pour l'orge, 150 kg/ha pour l'avoine, 220 kg/ha pour le seigle.

(2) Autorisé en stations de traitement des semences, fixes ou mobiles.

(3) Disponible en pack associatif avec PREMIS 25 FS (0,2 l/q).

(4) Produit biologique, transport et stockage entre + 4 et + 8°C, à ne pas mélanger (en l'absence d'informations) avec d'autres produits.

(5) ZNT aquatique : respecter une zone non traitée comportant un dispositif végétalisé permanent d'une largeur de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

(6) Pour protéger les organismes aquatiques, les semences doivent être incorporées dans le sol à une profondeur minimale de 3 cm.

(7) 2^{ème} nom commercial de SYSTINA : à utiliser associé à REDIGO 0,1 l/q ou avec PREMIS 25 FS 0,2 l/q

(8) Autorisé pour les cultures du blé de printemps, triticale de printemps, blé d'hiver et triticale d'hiver. Efficacité montrée sur *Tilletia tritici*, *Tilletia foetida* et *Tilletia contraversa*.

4 PROTECTION DES SEMENCES

Les informations chiffrées dans les cases correspondent aux doses des spécialités commerciales autorisées (l / quintal)

| spécialités commerciales | MALADIES des semences et du sol : usage « Champignons autres que pythiacées » - Principales cibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------|--------------------------------------|---|--|------------|---------------------|--------|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| | BLE , TRITICALE, ÉPEAUTRE | | | | | | | | ORGE | | | | | | AVOINE | | | | SEIGLE | |
| | CARIE COMMUNE | FUSARIOSES <i>F. graminearum</i> | FUSARIOSES <i>Microdochium spp.</i> | SEPTORIOSE <i>S. tritici</i> | CHARBON NU <i>Ustilago tritici</i> | Rhizoctone des céréales <i>R. cerealis</i> | PIETIN ECHAUDAGE | ERGOT | CHARBON NU <i>Ustilago nutans</i> | CHARBON COUVERT <i>Ustilago hordei</i> | HELMINTHOSPORIOSE <i>P. gramineum</i> | FUSARIOSES | PIETIN ECHAUDAGE | ERGOT | CHARBON NU <i>Ustilago avenae</i> | FUSARIOSES | ERGOT | FUSARIOSES | ERGOT | |
| FONGICIDES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinaigre ^(a) | 1,0 ^(b) | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | |
| TOLTEK ⁽ⁿ⁾ | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,05 ⁽ⁱ⁾ | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,05 ⁽ⁱ⁾ | 0,05▲ | | | | | | |
| DIFEND | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELEST NET | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ |
| PREPPER | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | | | | | 0,2 | 0,2▲ |
| SPIRATO | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ |
| CELEST GOLD NET | 0,2* ^(c) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ |
| DIFEND EXTRA | 0,2* | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ |
| CELEST POWER | 0,2* | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ |
| NEGEV | 0,1* | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1▲ | 0,1▲ | 0,1▲ | 0,1 | 0,1 - | 0,1 | 0,1 | 0,1▲ | 0,1▲ | 0,1 | 0,1 | 0,1▲ | 0,1▲ | 0,1 | 0,1▲ |
| VIBRANCE GOLD | 0,2* | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 ~ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ |
| CELEST ORGE NET | | | | | | | | | 0,2** | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | | | | | | |
| RUBIN PLUS | 0,15* | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15▲ | 0,15▲ | 0,15▲ | 0,15 | 0,15~ | 0,15 | 0,15 | 0,15▲ | 0,15▲ | 0,15 | 0,15 | 0,15▲ | 0,15 | 0,15 | 0,15▲ |
| SOLEGRI XS ^(k) | 0,015*~ | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015▲ | 0,015▲ | 0,015▲ | 0,015 ^(e) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015▲ | 0,015▲ | 0,015 | 0,015 | 0,015▲ | 0,015 | 0,015 | 0,015▲ |
| SYSTIVA ^(d) | 0,15*~ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15▲ | 0,15▲ | 0,15▲ | 0,15 ^(e) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15▲ | 0,15▲ | 0,15 | 0,15 | 0,15▲ | 0,15 | 0,15 | 0,15▲ |

4 PROTECTION DES SEMENCES

Les informations chiffrées dans les cases correspondent aux doses des spécialités commerciales autorisées (l / quintal)

| spécialités commerciales | MALADIES des semences et du sol : usage « Champignons autres que pythiacées » - Principales cibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------|--------|------------|-------|
| | BLE , TRITICALE, ÉPEAUTRE | | | | | | | | ORGE | | | | | AVOINE | | | SEIGLE | | |
| | CARIE COMMUNE | FUSARIOSES <i>F. graminearum</i> | FUSARIOSES <i>Microdochium spp.</i> | SEPTORIOSE <i>S. rotundum</i> | CHARBON NU <i>L. tritici</i> | Rhizoctone des céréales <i>R. cerealis</i> | PIETIN ECHAUDAGE | ERGOT | CHARBON NU <i>L. tritici</i> | CHARBON COUVERT <i>L. hardii</i> | HELMINTHOSPORIOSE <i>p. gramineum</i> | FUSARIOSES | PIETIN ECHAUDAGE | ERGOT | CHARBON NU <i>L. tritici</i> | FUSARIOSES | ERGOT | FUSARIOSES | ERGOT |
| CERALL ^(e) | 1,0 ^(b) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0▲ | 1,0▲ | 1,0▲ | 1,0▲ | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0▲ |
| REDIGO = MISOL | 0,1* | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1▲ | 0,1▲ | 0,1▲ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1▲ | 0,1▲ | 0,1 | 0,1 | 0,1▲ | 0,1 | 0,1 | 0,1▲ |
| REDIGO PRO | 0,05* | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,067 ^(g) | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067▲ | 0,067▲ | 0,067 | 0,067 | 0,067▲ | 0,05 | 0,05▲ | |
| RAXIL STAR | | | | | | | | 0,05** | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05▲ | 0,05▲ | 0,05 | 0,05 | 0,05▲ | | | |
| LATITUDE XL ^(h) | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 ⁽ⁱ⁾ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 ⁽ⁱ⁾ | 0,2▲ | | | | | | |
| PREMIS 25 FS | 0,2* | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ | 0,2▲ | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | 0,2 | 0,2▲ | |
| FONGI - INSECTICIDES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUSTRAL PLUS NET | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5▲ | 0,5▲ | 0,5▲ | 0,5▲ | 0,5▲ | 0,5 | 0,5 | 0,5▲ | 0,5▲ | 0,5▲ | 0,5 | 0,5▲ | 0,5 | 0,5▲ | |

(*) CARIE : spécialité contenant une substance active à action systémique, permettant un meilleur contrôle de la maladie en situation de sol contaminé.

(**) CHARBON NU : très bonne efficacité, permettant un meilleur contrôle de la maladie, à privilégier notamment en filière de production de semences pour éradiquer totalement la maladie et éviter la diffusion des résistances aux SDHI (cf. Note commune INRAE/ANSES/ARVALIS 2025).

(***) ERGOT : efficacité uniquement sur sclérotés résiduels dans les semences (après tri), pas d'efficacité sur les sclérotés présents dans le sol.

(a) Dilution Vinaigre 1 l + eau 1 l, désinfection superficielle des semences (pas d'efficacité en situation de sol contaminé par les spores de carie commune).

(b) Efficacité évaluée uniquement sur semences contaminées (blé tendre)

(c) L'usage de ce produit n'est pas préconisé par la firme vis-à-vis de la carie pour l'épeautre

(d) Disponible en pack associatif avec PREMIS 25 FS (0,2 l/q)

Les efficacités affichées pour cette spécialité sont issues d'évaluations conduites en 2012 et 2013, sans l'association avec Premis 25 FS à la dose de 0,2 l/q.

(e) Non autorisé vis à vis du contrôle du charbon nu sur orges de printemps.

(f) Attention, ce produit n'a pas d'AMM sur épeautre

(g) Efficacité renforcée de Redigo Pro vis-à-vis du charbon nu comparativement à Redigo par l'apport complémentaire de tébuconazole.

(h) Spécialité anti-piétin échaudage ne permettant pas une protection vis-à-vis des autres risques, à associer à un traitement fongicide pour le contrôle des autres maladies.

(i) Efficacité partielle à combiner avec des leviers agronomiques.

(j) Efficacité partielle à combiner avec des leviers agronomiques. Non recommandé en situation de blé sur blé

(k) 2^{ème} nom commercial de SYSTIVA : à utiliser associé à REDIGO 0,1 l/q ou avec PREMIS 25 FS 0,2 l/q

Source : ARVALIS - Protection des semences, lutte contre les ravageurs et la verse, en culture et au stockage - Mai 2025

| Légende | |
|----------------|--|
| Usage autorisé | |
| | Bonne efficacité |
| | Efficacité moyenne |
| | Efficacité faible |
| | Absence d'efficacité |
| | Manque d'informations |
| - | Efficacité à confirmer |
| ▲ | L'usage de ce produit pour protéger la culture contre cette cible n'est pas préconisé ni cautionné par la firme phytopharmaceutique. Le produit peut être appliqué sous la responsabilité de l'utilisateur, l'efficacité est renseignée à titre indicatif. |
| | Non autorisé |

Lutte contre les maladies foliaires et les ravageurs par le traitement des semences

Mai 2025

68

4 PROTECTION DES SEMENCES

Les informations chiffrées dans les cases correspondent aux doses des spécialités commerciales autorisées (l / quintal)

| spécialités commerciales | | MALADIES FOLIAIRES : usage « Champignons autres que pythiacées » - Principales cibles | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|---------------|--|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------|---|--------------------------------|-------|-----------------|
| | | BLE , TRITICALE, ÉPEAUTRE | | | | | | ORGE | | | | AVOINE | | | SEIGLE | | | |
| | | PIÉTIN VERSE des céréales | ŒDIUM <i>Blumeria graminis</i> | SEPTORIOSE <i>Septoria tritici</i> | HELMINTHOSPORIOSE <i>Helminthosporium tritici</i> repentis | ROUILLE JAUNE | ROUILLE BRUNE | RHYNCHOSPORIOSE <i>Rhynchosporium secalis</i> | ŒDIUM <i>Blumeria graminis</i> | ROUILLE NAINNE | ROUILLE JAUNE | HELMINTHOSPORIOSE <i>P. teres</i> | RAMULARIOSE | ŒDIUM | ROUILLE COURONNÉE <i>P. coronata</i> | SEPTORIOSE <i>S. avenae</i> | ŒDIUM | RHYNCHOSPORIOSE |
| | ped | feuilles | | | | | | feuilles | | | | feuilles | | | feuilles | | | |
| SYSTIVA (a) (b) (c) | | 0,15▲ | 0,15▲ | | 0,15▲ | 0,15▲ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | | 0,15▲ | 0,15▲ | | | | | | |

(a) Disponible en pack associatif avec PREMIS 25 FS (0,2 l/q).







(b) Conduits en 2012, 2013 et 2021, résultats à confirmer

(c) Recommandations sur blé comme sur orge : vis-à-vis des maladies foliaires limiter l'utilisation des SDHI à une seule application par saison, que ce soit avec un traitement de semences visant ces maladies foliaires ou un traitement en végétation (cf. Note commune INRAE/ANSES/ARVALIS 2025).

Si une application en cours de végétation s'avère nécessaire pour la protection contre les maladies foliaires, il est recommandé l'emploi de substances actives ayant un mode d'action différent de celui du fluxapyroxad (SDHI) : cf. dépliant Lutte en végétation contre les maladies fongiques des céréales à paille 2025.

| spécialités commerciales | | RAVAGEURS | | | | | | |
|--------------------------------|------|--|---|-------|------------------|---------------------------|----------|-------------------|
| | | Ravageurs des parties aériennes | | | Ravageurs du sol | Mouches | | Répulsif corbeaux |
| | | PUCERONS sur feuillage Vecteurs JNO | CICADELLES Vectrices maladie des pieds chétifs | ZABRE | TAUPINS | MOUCHE GRISE DES CEREALES | OSCINIES | |
| INSECTICIDES, REPULSIFS | | | | | | | | |
| LANGIS SIGNAL | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2▲ | | |
| ATTACK | 0,1▲ | 0,1▲ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1▲ | | |
| AUSTRAL PLUS NET (a) | 0,5▲ | 0,5▲ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5▲ | | |

(a) Autres usages fongicides.

| Légende | |
|---|--|
| Usage autorisé | |
|  Bonne efficacité |  Non autorisé |
|  Efficacité moyenne | |
|  Efficacité faible | |
|  Absence d'efficacité | |
|  Manque d'informations | |
| - Efficacité à confirmer | |
| ▲ L'usage de ce produit pour protéger la culture contre cette cible n'est pas préconisé ni cautionné par la firme phytopharmaceutique. Le produit peut être appliqué sous la responsabilité de l'utilisateur, l'efficacité est renseignée à titre indicatif. | |

Source : ARVALIS - Protection des semences, lutte contre les ravageurs et la verse, en culture et au stockage - Mai 2025

4 PROTECTION DES SEMENCES

Lutte fongicide au semis par traitement du sol

| Spécialité commerciale | Substance active (concentration % ou g/l) | Firmes | Usage | Application | Dose/Ha | Nb. applic. max |
|------------------------|---|-------------------|---|--|---------|-----------------|
| CONTANS WG | Coniothyrium minitans 100 g/kg | Bayer CropScience | Traitement général (toutes cultures protéagineux) contre le sclérotinia | Incorporé sur sol nu lors de la préparation du semis | 4 kg | 2 |

Source : Terres Inovia

Traitements des semences et local phyto



Les semences traitées ne sont pas stockées dans le local phyto.



Les traitements de semences en petits conditionnements sont stockés dans le local phyto.

ARVALIS est le plus grand institut de **recherche appliquée agricole** en France et le premier référent technique pour les grandes cultures.

Sa mission est d'assembler des connaissances et d'apporter des innovations utiles aux producteurs de céréales à paille (blé tendre, blé dur, orges, triticale, seigle, avoine, riz...), maïs (grain, semences, doux), de sorgho, de pommes de terre, de fourrages, de lin fibre, de tabac et aux filières économiques associées.

Créé par les agriculteurs et les filières qui le financent, ARVALIS contribue à développer la production de grain et de matières premières alimentaires et non alimentaires de qualité pour les marchés locaux, nationaux et internationaux.

En toute indépendance, ARVALIS mobilise son expertise pour l'**émergence de systèmes de production agroécologiques** qui combinent performance économique, sociale, environnementale et sanitaire.


350 agricultrices et agriculteurs membres des commissions régionales d'orientation professionnelle

+ de 450 collaborateurs dont plus de 220 ingénieurs et plus de 160 techniciens

26 sites de recherche et d'expérimentation sur le territoire hexagonal

100 000 micro-parcelles d'essais conduites par ARVALIS chaque année

80% de la superficie agricole française concernée par nos travaux



ARVALIS - 3, rue Joseph et Marie Hackin - 75016 PARIS tél. 01 44 31 10 00 - fax 01 44 31 10 10

Retrouvez les coordonnées des responsables et des experts sur www.arvalis.fr

Restons connectés !

Trouvez toute l'information technique dont vous avez besoin sur l'application ARVALIS infos

- Résultats d'essais et variétés
- Outils & Fiches
- Actus régionales
- Evènements
- Rappels agronomiques
- Webinaires & Replays




TÉLÉCHARGEZ-LA GRATUITEMENT !



DISPONIBLE SUR
www.arvalis.fr



DISPONIBLE SUR
Google Play



 **ARVALIS**

SU SNIPPER

SAATEN UNION

HAUT POTENTIEL
& FINITION RAPIDE :
TIREZ LE MEILLEUR
DE LA GÉNÉTIQUE

BPS - ½ PRÉCOCE

Potentiel élevé
Profil maladies sécurisant
Bons PS et taux de protéines élevés



ORGE 2 RANGS

MAJORETT

Précoce à bon potentiel de rendement

Bon comportement maladies et bon PS

Tolérante JNO et résistante mosaïque Y2

Variété distribuée par



Semences
de France

www.semencesdefrance.com



www.unisigma.com



UNISIGMA
RECHERCHE & CRÉATION VARIÉTALE

Stylor®

BIOSTIMULANT POUR SEMENCES DE PROTÉGÉINEUX



Sécurisez l'implantation des protéagineux

- **Accélère** la germination
- **Stimule** la croissance racinaire et foliaire
- **Sécurise** le peuplement de la parcelle
- **Favorise** l'installation de la culture

Gain en % du témoin non traité


Densité
et population
✓ **+9,1%**

Nombre de pieds/m² en moyenne sur 10 essais à 5 feuilles (2021-2025)





Couverture
du sol
✓ **+18,1%**

Couverture du sol (notation Canopeo) en moyenne

Rendement en q/ha



STYLOR® : ®Marque enregistrée ArystaLifeScience North America LLC - Détenteur d'AMM : Arysta LifeScience - Matière fertilisante - solution de potassium avec extrait végétal. Contenant 3% d'Exlicсын (extrait végétal) matière active biostimulante pour le traitement des semences et de l'hydroxyde de potassium en solution. P260 : Ne pas respirer les aérosols, vapeurs. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P330+P331 : EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501 : Éliminer le contenu/ récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation nationale. DANGER - H290 : Peut être corrosif pour les métaux. H302 : Nocif en cas d'ingestion. H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. ⚠️ ⚠️

UPL France - Tour Voltaire - 2^{ème} étage - 1 place des Degrés - 92800 PUTEAUX - Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@upl-ltd.com
www.upl-ltd.com/fr    



RESERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. À N'UTILISER QU'EN CAS DE BESOIN RECONNU. NE PAS DÉPASSER LA DOSE D'APPLICATION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



Nos missions en céréales à paille et protéagineux

- Mission de développement, conseils, services, connaissance des marchés et veille produit auprès des obtenteurs, de la recherche, des acteurs de la phytopharmacie et du machinisme agricole.
- Participe à la mise en place et à l'animation de réseaux expérimentaux (réseaux variétaux Céréales à Paille et Protéagineux et réseau de Protection des semences).
- Organise les productions de semences autogames auprès des coopératives actionnaires et concessionnaires de la marque Semences de France dans le cadre de la convention Semences de France.
- Commercialise les Semences de Céréales à Paille et Protéagineux sur le circuit long.

Notre organisation

La marque Semences de France céréales à paille et protéagineux est gérée comme une franchise.

48 Coopératives actionnaires vendent directement leur propre production à leurs Agriculteurs sous la marque Semences de France (circuit court). Semences de France CAPP vend aux Distributeurs qui n'ont pas de stations de semences (circuit long).

En amont, Semences de France expérimente les variétés des Obtenteurs avec pour objectif d'identifier les meilleurs variétés du marché grâce au **Variétoscope**.

Notre entreprise se charge d'obtenir les délégations variétales, coordonne les productions (semences de base et semences certifiées) et assure la commercialisation et la promotion des variétés.

BLÉ TENDRE D'HIVER

BPS

VOp

DUMBLEDDOR

Belle productivité et qualité de grain

Excellent comportement septoriose et rouille brune

Tolérant chlortoluron et piétin verse

Résistant cécidomyies orange



www.unisigma.com

Variété distribuée par



Semences
de France

www.semencesdefrance.com



ORGE D'HIVER
2 RANGS FOURRAGÈRE



Eternity



- + Excellent Poids Spécifique (note 8)**
- + Potentiel de rendement très élevé**
- + Très bon état sanitaire global**
- + Très bonne production de paille**



agriobtentions.fr

Légendes des tableaux

2

CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS

En règle générale, toutes les caractéristiques sont notées sur une échelle de 9 excellent à 1 très mauvais. Les échelles ne sont pas comparables d'une espèce à une autre. Une () signifie que la note doit être confirmée par des observations ou mesures supplémentaires.

BLÉ TENDRE

Classe Qualité

| | |
|-----|----------------------------|
| BAF | Blé Améliorant ou de Force |
| BPS | Blé Panifiable Supérieur |
| BP | Blé Panifiable |
| BB | Blé Biscuitier |
| BAU | Blé pour Autres Usages |

Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française

- **VRM** : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2026 (Récolte 2027)

| | |
|-----|---------------------------------------|
| VRM | Variétés Recommandées par la Meunerie |
| VO | Variétés en Observation |

- **BPMF** : Blés Pour la Meunerie Française - Récolte 2026

| | |
|------------------|--|
| p | blés panifiables |
| p* | ces variétés, en cumul, ne doivent pas dépasser 15% dans les mélanges BPMF panifiables |
| p ^{EXT} | blé panifiable à profil extensible |
| f | blés de force |
| f ^S | blé de force à profil souple |
| b | blés biscuitiers |
| c | blés correcteurs |

BLÉ DUR

Classe CTPS

| | |
|-----|------------------|
| BDE | Blé Dur Elite |
| BDQ | Blé Dur Qualité |
| BDS | Blé Dur Standard |

Avis du comité Français de la Semoulerie

VRSP variétés recommandées par les semouliers et pastiers (2025)

OBTENEURS OU REPRÉSENTANTS

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------|---------|-----------|--------------------|------------|----------|
| AO | Agri Obtentions | DSV | DSV France | LG | Limagrain Europe | ROL | Rolly | SF | Semences de France | SYN | Syngenta |
| BSA | BIOASAAT | FD | Florimond Desprez | KWM | KWS Moment | SEC | Secobra | SP | Sem Partners | UNI | Unisigma |
| CSP | CSPro | LD | Lemaire Deffontaine | RAG | RAGT | SAB | Saatbau | SU | Saaten Union | AUT | Autres |

ORGE

Classe qualité CTPS

| | |
|---|------------------------------------|
| A | Supérieur aux témoins brassicoles |
| B | Equivalent aux témoins brassicoles |
| F | Fourragère |
| C | Inférieur aux témoins brassicoles |

Avis de la chambre syndicale de la Malterie Française

Préf variété Préférée

Préf* variété Préférée, usage limité
Variété adaptée à certains cahiers des charges dont le débouché est à sécuriser

Obs2 variété en Observation commerciale et industrielle

Variété ayant subi les tests pilotes IFBM et soumise à des épreuves en site industriel en vue de vérifier que toutes les attentes fonctionnelles de fabrication des Malteurs et des Brasseurs sont respectées. Cette période doit permettre à la variété de se développer commercialement.

Obs1 variété en Observation commerciale et industrielle

Variété en cours de tests industriels en vue de vérifier que toutes les attentes fonctionnelles de fabrication des Malteurs et des Brasseurs sont respectées. Elles doivent être multipliées sur plus de 150 ha et présenter un intérêt pour un malteur et un brasseur.

Val variété en cours de Validation technologique

QUALITÉ

Poids Spécifique 1 faible à 9 élevé

Protéines 1 faible à 9 élevé

PROTÉINES - GPD BLÉ TENDRE, BLÉ DUR ET TRITICALE : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte positivement de cette droite, et inversement.

Viscosité et alimentation avicole (Source CTPS)

Si l'indice est supérieur à 3 risque de problème

RYTHME DE DÉVELOPPEMENT

| Alternativité | Précocité épiaison | Précocité montaison |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 - Très hiver | 4, 5 - Très tardif | 0 - Très tardif |
| 2 - Hiver | 5 - Tardif | 1 - Tardif |
| 3 - Hiver à ½ hiver | 5, 5 - ½ tardif | 2 - ½ tardif |
| 4 - ½ hiver | 6 - ½ tardif à ½ précoce | 3 - ½ précoce |
| 5 - ½ hiver à ½ alternatif | 6, 5 - ½ précoce | 4 - Précoce |
| 6 - ½ alternatif | 7 - Précoce | 5 - Très précoce |
| 7 - Alternatif | 7, 5 - Très précoce | 6 - Ultra précoce |
| 8 - Alternatif à printemps | 8 - Ultra précoce | |
| 9 - Printemps | | |

Hauteur 1 très court à 9 très haut.

Pouvoir couvrant 1 très peu couvrant à 9 très couvrant

PMG 1 très petit à 9 très gros

RÉSISTANCE AUX ACCIDENTS ET AUX MALADIES

| |
|-----------------------------------|
| 1 - Très sensible |
| 2 - Sensible |
| 3 - Sensible à assez sensible |
| 4 - Assez sensible |
| 5 - Assez sensible à peu sensible |
| 6 - Peu sensible |
| 7 - Assez résistant |
| 8 - Assez résistant à résistant |
| 9 - Résistant |

R = Résistante / T = Tolérante / S = Sensible

Sources : CTPS (les observations CTCS ont lieu essentiellement les 2 années précédant l'inscription), ARVALIS, Semences de France et les coopératives, Syndicats d'utilisateurs.

Les indications portées sur ce document reflètent l'état de la science et de la technique à la suite de nombreuses expérimentations. Les informations réglementaires peuvent évoluer et sont présentées dans l'état des connaissances à la date d'édition du document. Les dites informations données sous ces réserves ne sauraient engager la responsabilité des auteurs de ce document.



BLÉ TENDRE D'HIVER

BATMAN
CHEVIGNON
CONQUISTADOR
DUMBEDOR
FABULOR
FACILITY
FUNNY
GRIFONDOR
INTENSITY
JERIKO
JUNIOR
KAKTUS
KINGKONG
KWS ETOILE
KWS GLOBE
KWS MILLESIME
KWS PERCEPTIUM
LID SALTAREL
OUTDOOR

MÉLANGE CERTIMIX


6 : KINGKONG/RGT ARPEGIO/PONDOR
6,5 : JERIKO/OUTDOOR/KWS PERCEPTIUM
7 : THERMIDOR/CONQUISTADOR/KAKTUS

MÉLANGE CERTIMIX BIO

 MONTALBANO / PHILDOR / GWENN

PAILLEDOR
PONDOR
RGT ARPEGIO
RGT LOOKEO
RGT MONTECARLO
RGT PROFUSIO
RGT PROPULSO
SU HORIZON
SU MASTER
SU SAUVIGNON
SU SNIPPER
THERMIDOR


BLÉ PRINTEMPS

 **MOHICAN**
MOWGLI
TURETTAS



BLÉ TENDRE BIO

 APEXUS
 CAMILLUS
 CAMINADA
 EVERY
 GWENN
 MONTALBANO
 MOSSETTE
 PHILDOR
 SPINAS


BLÉ DUR

ANVERGUR
CATONE
 DIMOKRITOS
RGT BELALUR
RGT DEMESUR
RGT VOILUR
ROCAILLOU



TRITICALE

 BICROSS
GALAXOR
 LUMACO
PROMISO
RAFTING
REQUIN
RGT RUSTILAC
RGT RUTENAC

ORGE 2 RANGS

ALEKSANDRA
ATOMIC
ETERNITY
GOLDMARIE
MAJORETT
 MAJUSCULE
MANADE
KWS MATTIS


ORGE 6 RANGS

 ALIENOR
 KWS FUTURIS

ORGE PRINTEMPS

FONTANE

AVOINE HIVER

 KWS SULTANT
RGT BLACK STAR

AVOINE PRINTEMPS

CELESTE
 CANDICE
KWS TITANT
KWS LONCHANT


POIS HIVER

FOUDRE
JUMPER






POIS PRINTEMPS

KWS TELEGRAM
PERSAN
ORTOLAN

FÉVEROLE PRINTEMPS

CALLAS
 SYNERGY

SOJA

AFORIA
 AKUMARA
 ANNABELLA
ATACAMA
 AUSTRALIA
 ES COMPOSITOR
ES MENTOR
LID AVENTADOR
LID DETECTOR
LID DIAMANTOR
 LID YENDOR
MAESTRO
MAGNOLIA PZO
PAPRIKA
PRO VESUVIO

en couleur, les nouveautés

 Variété disponible en BIO

Des variétés
reconnues
par tous.

Thibaut Pinot
Ancien cycliste professionnel
Agriculteur/éleveur



LA SÉLECTION
PRÉFÉRÉE CÉRÉALES À PAILLE
ET PROTÉAGINEUX
2026



Voir la
sélection



Semences
de France

INTELLIGENCE
AGRICOLE