RADIS FOURRAGER
ANTI-NÉMATODES

MERCATOR

S'oppose fortement à la formation de HETERODERA SCHACHTII

Très tardive de floraison

Bonne sensibilité au gel

Semences de France
semencesdefrance.com

RADIS FOURRAGER ANTI-NÉMATODES
MERCATOR

S'OPPOSE FORTEMENT À LA FORMATION DE HETERODERA SCHACHTII

TRÈS TARDIVE DE FLORAISON

BONNE SENSIBILITÉ AU GEL

DOSES DE SEMIS

12 à 15 kg/ha

PÉRIODES DE SEMIS

> De avril à mi-novembre.

SPECTRE D'EFFICACITÉ ANTI-NÉMATODES

Niveau de résistance

NÉMATODES À KYSTES	
Globodera rostochienis / G.pallida	
Heterodera schachtii	
Heterodera avenae	
NÉMATODES À GALLES	
Meloidogyne incognita	
NÉMATODES DES TIGES	
NÉMATODES ENDOPARASITES MIGRATEURS DES RACINES	
NÉMATODES LIBRES	
BIOFUMIGATION	

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

INSTALLATION		
Vigueur d'implantation	Lent	Rapide
Capacité d'étouffement	Faible	Forte
PROFIL AÉRIEN		
Hauteur	Bas	Haut
Floraison	Précoce	Tardive
Biomasse	Faible	Élevée
PROFIL RACINAIRE		
Système racinaire	Fasciculé	Pivotant
Profondeur d'enracinement	Superficielle	Profond
PIÉGEAGE DES ÉLÉMENTS		
N	Faible	Fort
P	Faible	Fort
K	Faible	Fort
RESTITUTION DES ÉLÉMENTS		
Restitution potentielle	Faible	Forte
C / N	Bas	Élevé

RECOMMANDATIONS CULTURALES

Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface
Profondeur de semis optimale : 1 cm - Rouler après semis
Surveiller la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire
Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses de sols

Semences de France
semencesdefrance.com