




Radis

MERCATOR

Un outil agronomique à
positionner entre deux
cultures de vente



- S'oppose fortement aux nématodes
- Très tardif de floraison
- Grosse production de biomasse

Semences
de France 

www.semencesdefrance.com



Radis MERCATOR

Un outil agronomique à positionner
entre deux cultures de vente



Couvert
grande culture



Couvert
faunistique

Préparation du sol

Un travail du sol superficiel est recommandé afin de faciliter l'implantation.

Nous préconisons également un passage de rouleau pour favoriser le contact sol/graine.

Semis

Préférer un semis rapide derrière moisson afin de bénéficier de l'humidité encore présente dans le sol.

Semer à une densité adaptée, afin d'assurer une couverture du sol suffisante et d'éviter une concurrence trop importante de la flore adventice lors de la levée.

Protection de la culture

La destruction du Radis Fourrager MERCATOR peut se faire de différentes façons :

- par un gel supérieur à -8°C, Gel durant au moins 3 à 4 nuits, sur couvert bien développé
- Broyage – toucher le haut du collet
- Roulage sur gel – blesser le haut du collet
- Labour profond
- Destruction chimique.

Moyenne des rendements 2010-2011

	MERCATOR	IRIS	CARLOS (T)	DOUBLET (T)
Rendement matière verte T/ha	39,09 (113,52%)	41,3 (131%)	36,95 (107,50%)	33,60 (92,50%)
Teneur matière sèche %	11,03	12,35	11,39	11,65
Rendement matière sèche T/ha	3,95	4,84	3,91	3,52
Hauteur cm	73	113	87	4,3
Verse (9=sensible)	1	6,8	4,3	1

Source: CTPS.

Test H.Schachtii - moyenne 2010-2011

	MERCATOR	IRIS	CARLOS (T)	DOUBLET (T)
Indice d'attaque	0,18	7,45	0,89	0,32
Indice de résistance	97,55	0	88,30	95,67
Classe	H1	S	H2	H1

Classe H1 : s'oppose très fortement à la multiplication de H.Schachtii
Classe H2 : s'oppose fortement à la multiplication de H.Schachtii
Classe H3 : s'oppose moyennement à la multiplication de H.Schachtii
Classe S : ne s'oppose pas à la multiplication de H.Schachtii

- MERCATOR s'implante rapidement, sa couverture est totale, ce qui limite fortement le salissement.
- Forte production de biomasse
- Sa tardiveté de floraison permet de le positionner sur des semis précoces (avant mi- Aout) avec une moindre sensibilité aux stress hydriques.
- De par son fort développement végétatif, MERCATOR forme une litière végétale qui permet de réduire fortement l'action destructurante des gouttes de pluies qui ne frappent pas la surface du sol.
- Une forte biomasse racinaire qui joue un rôle important pour décompacter ou restructurer le sol.
- MERCATOR est noté H1 = la classe qui s'oppose le plus fortement à la multiplication du nématode H. Schachtii.
- Semer à la dose de 15 kg/ha en pur.

Date de création: 11/2015.



SEMENCES DE FRANCE

62, rue Léon Beauchamp - BP 18
59932 La Chapelle d'Armentières Cedex
Tel : +33 (0)3 20 48 41 41 - Fax : +33 (0)3 20 48 41 30
Email: contact@semences-de-france.fr

www.semencesdefrance.com