



FÉTUQUE ÉLEVÉE

OVALIE



Très bonne productivité estivale

Résistance aux maladies

Excellente valorisation par l'animal



**Semences
de France**

semencesdefrance.com



FÉTUQUE ÉLEVÉE TARDIVE OVALIE

TRÈS BONNE
PRODUCTIVITÉ
ESTIVALE

RÉSISTANCE AUX
MALADIES

EXCELLENTE
VALORISATION
PAR L'ANIMAL

IDENTIFICATION

TARDIVITÉ	Tardive
FLEXIBILITÉ DES FEUILLES	7,1
PÉRENNITÉ	7 ans et plus
DÉPART EN VÉGÉTATION	22 mars
ÉPIAISON	8 mai

+111%
CTPS

OVALIE est une fétuque élevée de haute qualité.

Tardive à épiaison, sa grande souplesse d'exploitation facilite une exploitation au stade optimal en fauche comme au pâturage.

Très flexible de feuillage et doté d'un très haut niveau de résistance aux maladies, OVALIE offre appétence et valorisation par l'animal.

OVALIE se démarque par une forte productivité en été/automne, ce qui sécurise l'approvisionnement en fourrage dans les conditions les plus difficiles.

Riche en sucres, OVALIE assure énergie et conservation du fourrage.

DOSES DE SEMIS

25 kg/ha

PÉRIODES DE SEMIS

- > De mi-mars à fin-avril
- > De 15 août au 15 septembre

CARACTÈRES AGRONOMIQUES

Flexibilité du feuillage
De 1 à 9 = très flexible




Souplesse d'exploitation
Durée en jours



Résistance aux rouilles
De 1 à 9 = résistant



Maladies diverses
De 1 à 9 = résistant



Sources CTPS

RENDEMENT EN MATIÈRE SÈCHE

		OVALIE	TÉMOIN
Pluriannuel	1 ^{ère} coupe (A2+A3)	3,2	3,5
	Printemps (A2+A3)	12,3	12,7
	Été-automne (A2+A3)	6,0 108%	5,5
	Total A1 + A2 + A3	23,1 102%	22,6

Sources CTPS. Témoin = (Volupta + Barquillo)/2

ASSOCIATIONS POSSIBLES

OVALIE
(20KG)



+ LUZERNE (15 À 20KG)

OVALIE
(10KG)



+ T. VIOLET 2N (10KG)

+ T. BLANC INTERMÉDIAIRE (5KG)

OVALIE
(1 À 12KG)



+ RGA 4N (10KG) RGA 2N (5KG) T. BLANC INTERMÉDIAIRE (3 À 5KG)

+ DACTYLE (8 À 10KG) + RGA (5 À 10KG)

+ T. BLANC INTERMÉDIAIRE (5 À 10KG)

RECOMMANDATIONS CULTURALES

Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface

Profondeur de semis optimale : 1 cm - Rouler après semis

Surveiller la présence d'adventices et de ravageurs, intervenir si nécessaire

Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses de sols