



Ray-grass Anglais 4n

SORAYA



Il forme rapidement une grande
masse de feuilles



- Très bonne tolérance aux influences hivernales
- Conservation plus facile en ensilage
- Bouclier contre les maladies en toutes saisons

Semences
de France 

www.semencesdefrance.com



Ray-grass Anglais 4n SORAYA

Il forme rapidement une grande masse de feuilles



Ensilage



Enrubannage
- Foin



Déprimage
- Pâturage



Foin - Regain

Identification

| | |
|-------------|---------------|
| Ploïdie : | tétraploïde |
| Tardiveté : | intermédiaire |
| Pérennité : | 5 ans |
| Epiaison : | 19 mai |
| Souplesse : | 53 jours |

Préparation du sol

S'assurer que la parcelle est propre avant de semer : si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non d'un désherbage.

Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface, pour permettre un bon contact sol/graine.

Semis

Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité voulue. En cas d'association d'espèces, penser à bien mélanger les semences.

Déposer les semences à 1 cm de profondeur au maximum. Rouler pour refermer le semis.

Protection de la culture

Surveiller la population de limaces et traiter si nécessaire.

Ne pas hésiter à désherber la jeune prairie afin de préserver sa population, son rendement, sa qualité et sa pérennité.

Fertilisation

Raisonnement en fonction des analyses de sols et de la CEC pour déterminer la fréquence des apports, les dates et les quantités.


Tenir compte de la réglementation en vigueur. En cas d'association avec une légumineuse, ne pas oublier d'adapter les apports de N, P et K de façon à maintenir l'équilibre des populations.

Entretien

Différentes opérations d'entretien mécanique peuvent être pratiquées :

- Fauche des refus ;
- Ebousage ;
- Hersage.

Caractères agronomiques



Rendement en matière sèche (en tonnes / ha)

| | SORAYA | Témoïn |
|--|--------|--------|
| Pluriannuel 1 ^{ère} coupe (A2+A3) | 4,96 | 4,2 |
| Printemps (A2+A3) | 14 | 13,5 |
| Eté-Automne (A2+A3) | 5,1 | 4,8 |

Source: CTPS. Témoïn = (Proton + Cantalou)/2

Associations et doses possibles

SORAYA 25 kg + trèfle blanc ladino 3 à 5 kg

SORAYA 20 kg + trèfle violet 8 kg

SORAYA 15 à 20 kg + RGA 2n 7 à 10 kg + trèfle blanc intermédiaire 3 à 5 kg

SORAYA 10 kg + RGA 2n 5 kg + fétuque élevée 10 kg + trèfle blanc intermédiaire 3 à 5 kg

SORAYA 10 kg + RGA 2n 5 kg + dactyle 7 kg + trèfle blanc intermédiaire 3 à 5 kg

- SORAYA se développe rapidement après le semis et forme un gazon très dense.
- Il convient particulièrement bien pour une utilisation en fauche intensive et en pâture.
- Sa très bonne résistance aux maladies, en particulier contre la rouille couronnée, assure une bonne qualité de fourrage sur les repousses d'été et d'automne.
- Semer à la dose de 30 kg/ha en pur.
- Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéristiques climatiques de votre région:
 - Du 15 mars à fin avril ;
 - Du 15 août au 15 novembre.

Date de création: 09/2014.



SEMENCES DE FRANCE

62, rue Léon Beauchamp - BP 18
59932 La Chapelle d'Armentières Cedex
Tel : +33 (0)3 20 48 41 41 - Fax : +33 (0)3 20 48 41 30
Email: contact@semences-de-france.fr

www.semencesdefrance.com