



SORGHO FOURRAGER

# SUDAL





## IDENTIFICATION

TYPE	Sorgo x Sudan grass
UTILISATION	Ensilage et pâturage
PRÉCOCITÉ	Précoce
INSCRIPTION	2005
ZONE DE CULTURE	Toutes zones de cultures de maïs

En général : la 1ère coupe doit être réalisée 60 jours minimum après le semis et la 2ème coupe 30 à 35 jours plus tard.

Les sorghos sont excellents au pâturage, il faut préférer une exploitation rationnée ou de rotation.

Pour éviter les risques d'acide cyanhydrique au pâturage attendre que le fourrage atteigne 60 cm de hauteur.

**DOSES DE SEMIS** 25 kg/ha en pur

## PÉRIODES DE SEMIS

> À partir de fin mai/début juin

## RÉSULTATS D'ESSAI

	Largeur feuille	Hauteur C1	Helmint HO. C1	Hauteur C2	EPI	Helmint HO. C2	Hauteur C3	Helmint HO. C3	EPI
PIPER	4	152	4,5	91	3,3	7	95	7	3,6
SUDAL	6,5	154	3	75	1,3	3,3	83	3	5,6

Semis 8/06/17	Production cumulée TMS/HA		
DATE COUPE	27/07/17	20/08/17	24/10/17
SUDAL	6,7	9,7	14,3
PIPER	5,6	9,4	13,8

## APTITUDE AGRONOMIQUES

VIGUEUR DE DÉPART	Bonne
DÉVELOPPEMENT VÉGÉTATIF : HAUTEUR DE PLANTE LUXURIANCE RAMIFICATIONS (TALLES)	Haute Très bonne Importante
CAPACITÉ DE REPOUSSE	Bonne
TYPE DE PANICULE	Compact
GRAIN ET TENEUR EN TANINS	Grain moyen
PRODUCTIVITÉ	Très bonne Jusqu'à 13 TMS/ Ha

## QUALITÉS TECHNOLOGIQUES

VALEUR ALIMENTAIRE	Bonne
DIGESTIBILITÉ	Très bonne
PRÉCOCITÉ	Précoce
CARACTÈRE BMR	Non
PHOTOSENSIBILITÉ	Non