



SORGHO FOURRAGER SUDAL

Son identité

Type sorgho hybride :	Sorgo x Sudan grass
Utilisation :	Ensilage et pâturage
Précocité :	Précoce
Zone de culture :	Toutes zones de culture de maïs
Inscription :	2005

Ses aptitudes agronomiques



Hauteur 130 cm, 52 jours après le semis, en utilisation ensilage.

Vigueur de départ :	Bonne
Développement végétatif : - Hauteur de plante : - Luxuriance : - Ramifications (talles) :	Haute Très bonne Importante
Capacité de repousse :	Bonne
Type de panicule :	Compact
Grain et teneur en tanins	Grain moyen
Productivité :	Très bonne Jusqu'à 13 TMS/ Ha

Ses qualités technologiques

Valeur alimentaire :	Bonne
Digestibilité :	Très bonne
Précocité :	Précoce
Caractère BMR :	Non
Photosensibilité :	Non



SORGHO FOURRAGER SUDAL



Résultats d'essai Masseube :

	Largeur Feuille	HAUTEUR C1	HELMINT HO. C1	HAUTEUR C2	EPI	HELMINT HO.C2	HAUTEUR C3	HELMINT HO.C3	EPI
PIPER	4	152	4,5	91	3,3	7	95	7	3,6
SUDAL	6,5	154	3	75	1,3	3,3	83	3	5,6

Semis 8/06/17	PRODUCTION CUMULEE TMS/HA		
DATE COUPE	27/07/17	30/08/17	24/10/17
SUDAL	6,7	9,7	14,3
PIPER	5,6	9,4	13,8

Conseils de culture

- La date de semis idéal est **fin mai, début juin**.
- La dose de semis : **25 kg/ha**, la température minimum **12°C**.
- **100 Unités d'azote** au semis et 50 unités après chaque coupe.
- En général : la 1ère coupe doit réalisée 60 jours minimum après le semis et la 2ème coupe 30 à 35 jours plus tard.
- Les sorghos sont excellents au pâturage, il faut préférer une exploitation rationnée ou de rotation.
- Pour éviter **les risques d'acide cyanhydrique au pâturage** attendre que le fourrage atteigne **60 cm** de hauteur.